

## 2022 大学院案内



### 理学研究科

理学専攻・物理科学領域  
宇宙地球物理学コース

### 工学研究科

電気工学専攻  
宇宙電磁環境工学講座

### 環境学研究科

地球環境科学専攻  
地球水循環科学講座  
地球史学講座



# 宇宙地球環境研究所における研究

## はじめに

このパンフレットは、名古屋大学宇宙地球環境研究所 (Institute for Space-Earth Environmental Research、略称 ISEE)において、大学院での学習・研究を志す皆さんに向けた参考資料です。宇宙地球環境研究所は、地球・太陽・宇宙を相互に影響を及ぼし合う一つのシステムとしてとらえ、そこに生起する多様な現象のメカニズムや相互関係の解明を通して、地球環境問題の解決と宇宙に広がる人類社会の発展に貢献することを目指して研究を進めています。また、名古屋大学大学院理学研究科、工学研究科、環境学研究科の3研究科の協力講座として、大学院教育を行っています。大学院の学生は、それぞれの研究室に配属され、指導教員のもとで修士論文、博士論文に向けた研究を進めます。

本パンフレットでは、宇宙地球環境研究所の研究室で大学院教育の一環として行われている研究内容を詳しく紹介するとともに、学生生活や大学院入試、卒業後の進路等についても触れています。実際の大学院生の募集と入学試験の実施は、宇宙地球環境研究所ではなく、理学研究科、工学研究科、環境学研究科が行います。受験を希望する方は、希望する研究室により受験する研究科・専攻が異なることに留意し、対応する研究科のウェブサイト等の入試情報も参考にしてください。また受験前に希望する研究室の教員にコンタクトを取り、直接話を聞くことをお勧めします。このパンフレットがみなさんの進路を決める道標となれば幸いです。

太陽は可視光、赤外線、紫外線といった電磁波を放出し、私たちの暮らす地球のエネルギー源としてなくてはならない存在です。また、電子、イオンなどのプラズマ粒子を放出して太陽圏や地球周辺の宇宙空間（ジオスペース）の電磁環境にも影響を与えています。太陽表面で起きるフレアなどの爆発的な現象や、それらに影響を受けて変動するジオスペースでは大量の高エネルギー粒子が生成され人工衛星に障害を与えたり、地上の通信障害を引き起こしたりします。壮大なオーロラが数多く発現するのもこの様な宇宙空間の擾乱に起因しています。

また、太陽放射のエネルギーは地球の大気及び地表面での吸収・散乱・再放射を通して再分配され、大気・陸域・海洋で様々な現象を起こします。太陽活動のメカニズムと地球環境への影響を理解し予測することは現代社会に生きる私たちにとって重要な課題です。

宇宙地球環境研究所では、総合解析、宇宙線、太陽圏、電磁気圏、気象大気、陸域海洋圏生態、年代測定の各基盤研究部で進める基盤的研究を縦糸に、これらの基盤研究を分野横断的につなげて新たな展開を目指す融合研究プロジェクトを横糸にして研究を進めています。これまでの融合研究プロジェクトには、太陽活動や大気海洋活動の変動が地球環境へ与える影響を正しく理解し、予測するための技術と手法を開発する「宇宙地球環境変動予測」、地球上部のプラズマと中層大気との間で引き起こされる様々な相互作用の総合的な理解を目指す「大気プラズマ結合過程」、銀河系宇宙線の影響も含めてエアロゾルから雲・降水粒子が形成される過程、雲・エアロゾルによる放射の散乱・吸収過程を実験・観測・シミュレーションを通して明らかにすることを目指す「雲・エアロゾル過程」、放射性同位体を用いて過去数千年以上の太陽活動の長期変動の歴史を読み解き、太陽活動が地球の気候に与える影響を明らかにする「太陽活動の気候影響」がありました。2022年度からは、これらの研究をさらに発展させる新たな融合研究の展開を目指します。


さらに研究所では、国内の4つの附属観測所を含む国際的なネットワーク観測と国際共同研究を推進する「国際連携研究センター」、様々な観測データの集約と最先端のコンピューターシミュレーションを推進する「統合データサイエンスセンター」、航空機、気球、ロケット、人工衛星などの飛翔体を利用した将来の観測計画やその観測機器開発を推進する「飛翔体観測推進センター」の3つの附属センターが基盤研究部と連携しながら国内外の関連分野の研究を支援・推進します。

－表紙画像－



# 宇宙地球環境研究所における研究対象

# INDEX



宇宙地球環境研究所における研究	1
宇宙地球環境研究所における研究対象	2
宇宙地球環境研究所の大学院講義 (理学 / 工学 / 環境学研究科)	4
<hr/>	
研究室の紹介	
<b>理学研究科</b>	<hr/>
● 大気圏環境変動研究室 AM	6
● 宇宙空間物理学観測研究室 SSE	8
● 太陽宇宙環境物理学研究室 SST	10
● 宇宙線物理学研究室 CR	12
● 太陽圏プラズマ物理学研究室 SW	14
<b>工学研究科</b>	<hr/>
● 宇宙電磁観測グループ	16
● 宇宙情報処理グループ	18
<b>環境学研究科</b>	<hr/>
● 気象学研究室	20
● 雲降水科学研究室	22
● 大気化学研究室	24
● 水文気候学研究室	26
● 海洋学研究室	28
● 地球年代学研究室	30
● 環境史学研究室	32
<hr/>	
学生生活	34
学生の声	36
就職状況	38
大学院入試	40
学生支援	41
修士・博士論文一覧	42
受賞一覧	43
研究室と教員一覧	44
交通案内	45




# 宇宙地球環境研究所（ISEE）の大学院講義 (理学/工学/環境学研究科)

宇宙地球環境研究所（ISEE）の教員が理学・工学・環境学の各研究科で担当している講義や講究（セミナー）を紹介します。各研究科の授業科目は、それぞれ異なる研究科の研究にも密接に関連しています。

## コースツリー

### 博士前期課程



### 修士学位（理学・工学・環境学）

### 博士後期課程

博士論文の作成

各専門分野で研究をさらに深める。

### 博士学位（理学・工学・環境学）

宇宙地球環境研究所基盤研究部門	総合解析	宇宙線	太陽圏	電磁気圏	気象大気	陸域海洋圏生態	年代測定
各研究科の研究室	太陽宇宙環境物理学（SSP）	宇宙線物理学（CR）	太陽圏プラズマ物理学（SW）	宇宙空間物理学観測（SSe）	大気圏環境変動（AM）	水文気候学	地球年代学
	宇宙情報処理			宇宙電磁観測	宇宙電磁観測	海洋学	環境史学
					気象学		
					大気化学		
					雲降水科学		

※修了要件や履修科目等の最新の情報は、各研究科・専攻からの案内などで確認してください。

ISEE の各研究部門に所属している教員は、理学・工学・環境学の各研究科の協力教員として、関連講座の授業を担当しています。各研究部門の研究分野は、研究科の枠を超えて多岐に渡ります。皆さんはそれぞれの研究科に入学後も、研究所のなかで、同じ研究室で他の研究科と交流を持ちながら、学習や研究を進めていくことができます。ここでは、在学生の皆さんのが研究科をまたいで履修している授業科目の一部を紹介します。


※教員の所属については、巻末のページを参照してください。

### 地球学 1（環境学研究科）・地球学特論（理学研究科）

宇宙地球環境に関する諸分野を専門としている ISEE の教員と環境学研究科地球環境科学専攻の教員が、宇宙地球環境を一つのシステムとしてとらえ、その関連分野を俯瞰し理解するオムニバス形式の講義を行います。太陽－地球－生命圏相互作用系（SELIS）を学び、宇宙的視野に立つことによって、人類が今後どのように気候変動に適応していくべきかについて総合的に学ぶことができます。環境学、理学両研究科の講義として開講され、両方の学生が同時受講しています。自分の専門分野以外の事象や研究についても興味を抱き、自らが進める研究の位置づけと意義を考えることができます。

#### 【講義内容】

- 1-1. ミランコビッチサイクルと氷期・間氷期サイクル
- 1-2. 太陽 - 地球 - 生命圏相互作用系（SELIS）
- 2-1. 銀河宇宙線と太陽宇宙線
- 2-2. 宇宙線生成核種を用いた過去の太陽活動の復元
- 3-1. 大気圏の良い／悪いオゾン
- 3-2. 大気エアロゾルがもたらす気候・環境影響
- 4-1. 海洋と炭素循環
- 4-2. 海洋リモートセンシング
- 5-1. 陸域生態系と水・炭素循環
- 5-2. 気候変動とともにう水・炭素循環の変動が北極社会に及ぼす影響
- 6-1. 樹木年輪セルロースを用いた古气候復元
- 6-2. 古气候データから読み取る日本の歴史



### 先端物理学基礎 III（理学研究科）

地球学と同様に、宇宙・太陽・地球・惑星間空間からなる「宇宙地球環境システム」の構造を理解するため、そこで観測される様々な物理現象を概観します。基礎的な既知の諸現象から研究途上の最先端な未解決の現象までを、ISEE の理学研究科と環境学研究科の教員がオムニバス形式で毎回紹介します。この講義の特徴は、単なる現象の紹介だけにとどまらず、それらの現象を理解するために必要なプラズマ物理、力学、宇宙線、電磁放射などの物理の基礎概念もしっかりと学ぶことができるところです。理学研究科の講義として開講され、ISEE 以外の理学専攻・物理学領域の学生も多数受講します。また、工学研究科、環境学研究科の学生も受講することができます。

#### 【講義内容】

- 1-1. 太陽地球環境システムの概要
- 2-1. プラズマ物理の基礎
- 2-2. 太陽大気構造・太陽活動現象
- 2-3. 太陽風の加速と太陽圏の形成
- 2-4. プラズマ中の電波伝搬
- 3-1. 相対論的荷電粒子の運動と散乱、光子と物質の相互作用
- 3-2. 荷電粒子からの放射、対生成
- 3-3. 高エネルギー粒子の加速と伝搬
- 3-4. 地球環境解析のトレーサとしての宇宙線生成核種
- 4-1. 磁気圏構造・ダイナミクスとジオスペース環境
- 4-2. 極域超高层大気とオーロラ活動の影響
- 4-3. 電離圏構造・ダイナミクスと観測手法
- 5-1. 大気圏の形成と構造、太陽放射と温室効果
- 5-2. 降水システムの観測とシミュレーション
- 5-3. 海洋変動





水野 亮 教授



長瀬 智生 准教授

## 観測・実験により大気の姿を正確に捉え、大気変動を引き起こしている自然的・人為的要因とそのメカニズムを解明する。

地球誕生以来、約46億年という非常に長い時間かけて形成された地球大気。大気は動植物の生命活動に不可欠であることはもちろん、太陽から受け取った放射エネルギーの一部を吸収・反射し、地表の温度を一定に保つ働きを担っています。しかし近年、産業革命以降の人間活動の急速な拡大によって、地球大気の年齢に比べれば遙かに短い時間スケールで、大気環境に様々な問題を生じています。例えば、二酸化炭素やメタンなどの温室効果ガスの濃度は増加し続け、気候変動への影響が懸念されています。また、エアコンの冷媒等に使われてきたフロンガスをはじめ人工物質の使用によるオゾン層の破壊、航空機や自動車から排出される窒素酸化物や硫黄酸化物のもたらす酸性雨等、深刻な影響が現れています。大気環境変動は人類の未来に直接関わる問題です。将来の環境変動を正しく予測するためにも、観測に基づいて大気の姿を正確に捉え、大気変動を引き起こしている自然的・人為的要因とそのメカニズムを解明する必要があります。大気圏環境変動(AM)研究室では、最先端技術を駆使して開発した電波受信技術・赤外線分光技術を用いて、フィールド観測や室内実験によって大気環境変動の諸問題に真正面から迫っています。また、地球大気の理解のための相互比較系として、惑星大気を観測する計画にも着手しています。

### 中層大気微量成分の短期・長期変動観測による太陽活動の地球大気環境への影響の解明

中層大気といわれる高度15kmから80kmまでの成層圏・中間圏では、大気中の微量成分組成は地球内外の環境変動の影響を受けて常に変動しています。例えば、温室効果ガスの排出等による気候変動や特定フロン等の排出によるオゾン層破壊など人為的な環境変動だけでなく、11年周期の太陽活動の変化や季節変化、磁気嵐等の地球周辺環境の突然的な変化、大気波動や火山活動、エルニーニョなどの自然変動も大気の輸送や化学反応を介して大気微量成分の組成に影響を与えていました。しかし、環境変動はごく微少であったり長期に及んだりするため、これらと大気組成変動との関連はまだ十分には理解されていません。そこで私たちは大気中の分子から放射される微弱な線スペクトルを捉える超伝導ミリ波分光計を北海道、南極昭和基地、北欧ノルウェー、南米アルゼンチンなどに展開し、オゾンやオゾン破壊関連分子、二酸化炭素などの温室効果ガスなどの様々な大気微量分子の高度分布の観測の研究を進め、太陽活動の影響を受けやすい中間圏や、大気輸送と化学反応が影響しやすい下部成層圏などの組成変動メカニズムの解明を皆さんとともに目指します。




北欧ノルウェー・トロムソに設置した超伝導ミリ波分光計用コントナハウス（中央）とオーロラ




(1)



(2)



(3)



(4)




(5)

(6)

### 微弱な大気分子スペクトルを検出する超伝導薄膜センサーを用いた観測装置の開発


オゾンなどの大気分子の観測には、ミリ波～サブミリ波という非常に波長の短い電波を使います。私たちは、大気中の微量分子が発する微弱な電波を高い感度で検出するため、宇宙電波の観測でも用いられている超伝導薄膜センサー（超伝導SIS素子）を自分たちの手で設計・開発しています。超伝導SIS素子は、等価電気回路シミュレーターや有限要素電磁界シミュレーターなどを用いて設計し、専用のクリーンルームの中で超伝導薄膜を積層して製作されます。これまでに、110GHz帯（波長約2.7mm）、250GHz帯（波長約1.2mm）で量子雑音限界に迫る高感度なセンサーを開発するとともに、このセンサーを用いた受信機システムを実用化し、北海道・陸別町（1999年～）、チリ・アタカマ高地（2005年～2015年）、南極・昭和基地（2011年～）、アルゼンチン・リオガジェゴス（2011年～）において、長期に渡るモニタリング観測に使用しています。大学院生の皆さんには、世界最先端のテクノロジーによる開発から、実際のフィールドでの観測、データ解析アルゴリズムの開発に至るまで、スタッフとともに首尾一貫して研究に取り組んでいます。



北海道の陸別観測所に設置されたミリ波分光計（左）、電磁界解析による導波管回路の電波伝搬の計算（右上）、超伝導SIS素子中心部の顕微鏡写真（右下）

### 赤外分光観測による対流圏・成層圏微量成分の長期変動とその影響評価


二酸化炭素やメタンなどの温室効果ガスに代表されるように、大気中の気体分子の多くは赤外線に対して強い吸収をもっています。そこで赤外域での吸収量を波長ごとに細かく測定することで、気体分子ごとの大気中の存在量を知ることができます。私たちは、1995年北海道陸別観測所に高分解能フーリエ変換型赤外分光器（FTIR）を、また2014年からは同地に国立環境研究所が設置した新型高分解能FTIRを用いて太陽光の分光観測を共同して行っています。太陽光のスペクトル中には、大気中の微量分子ごとの吸収成分（吸収スペクトル）が表れます。そこで、観測されるスペクトルからオゾンや塩酸、フロンガス、二酸化炭素、メタン、エタン、一酸化炭素など10種類以上の気体成分の大気中の気柱量や高度分布を求め、その時間変動を長期間にわたり監視することで、気候変動などのグローバルな地球環境変動への影響評価を行っています。また森林火災や都市域で発生する汚染大気の大気輸送の影響など、地域スケールでの大気質時間変動の影響評価も併せて進めています。



陸別観測所で稼働している高分解能FTIR（国立環境研究所が保有）（左）と観測されたオゾン、水蒸気、二酸化炭素及び四塩化炭素の吸収スペクトル（右）

### 南米におけるオゾン／紫外線、エアロゾル観測網の整備とリスク情報伝達システムの開発


南米大陸南端部では、オゾンホールが上空にまで張り出していくことがあります。地域住民にとってオゾンホールは南極の特別な現象ではなく、日常生活に影響を及ぼします。私たちは南米のアルゼンチン、チリとの国際協力のもと、超伝導ミリ波分光計をはじめとして、オゾンライダー、紫外線分光計、オゾンゾンデなどの最先端の観測機器を南端部の大気観測所に整備しオゾン層／オゾンホールのモニタリングを行っています。また、南米では数年に一度程度の頻度で南米アンデス山脈の火山が噴火を起こし、成層圏に吹き上げられた火山灰が数千km彼方まで飛んで行き飛行機の運航に影響を与えることがあります。火山灰の動きをモニターし予測するためのエアロゾルライダー観測網を国立環境研究所および現地の研究者とともに整備をしました。そして、研究機関はもとより両国の環境省、気象局、保健省、鉱山省、危機管理局の行政官らと協議をしながら、観測データをもとに必要時にオゾン／紫外線や火山灰の注意報や警報を一般市民や関係機関に配信するリスク情報伝達システムを新たに開発し、国際社会にも貢献しようとしています。



南米南端のリオガジェゴスでのオゾンの高度別混合比の時間変化。黄色い網かけがオゾンホール通過時（左）。NASAの人工衛星による2014年11月13日のオゾン全量マップ（右）

### ミリ波・サブミリ波望遠鏡による太陽系内惑星の大気環境変動の観測的研究

私たちは理学研究科の「NANTEN2」や、国立天文台の「ASTE」や「45m望遠鏡」などのミリ波・サブミリ波電波望遠鏡を用いて、太陽系内惑星の観測を進めています。惑星大気中の微量成分の同位体比や組成変動を観測することで、現在の惑星の気候や大気組成、太陽活動・宇宙線や彗星衝突などの外的要因が惑星大気に与える影響、さらには太陽系や惑星の形成機構や生命の起源、そして地球大気の独自性や将来予測について理解を深めることで重要な知見が得られます。2012年からはアタカマ高地にて日・欧・米の国際協力による「ALMA」大型電波干渉計が本格観測を開始し、太陽系内惑星をこれまでにない超高空間・速度分解能で観測したデータが次々ともたらされています。惑星大気組成・ダイナミクスの研究において、これらのデータを活用することで大きなブレークスルーが期待されています。私たちはALMAを含めた国内外の望遠鏡を駆使し、皆さんと一緒に惑星の大気観測を進め、そこでの大気環境変動の実態に迫ります。




ASTE望遠鏡（左）で木星の硫化炭素（CS）を観測した場合のシミュレーションスペクトル（右）

写真の説明：左より (1)AM研集合写真、(2)院生が参加した南極観測隊、(3)学会発表風景、(4)ノルウェーでのミリ波観測、(5)実験室で装置開発、(6)AM研暑気払い（2019年の写真）

Webページ：<https://skx1.isee.nagoya-u.ac.jp/>  
連絡先：mizuno@isee.nagoya-u.ac.jp（水野）





平原 聖文 教授

野澤 悟徳 准教授

大塚 雄一 准教授

大山 伸一郎 講師

## 宇宙空間と地球・惑星環境の間で生起し変動する多様な自然現象に対して、独自の観測的・実験的研究を展開し、それらの成因・機構に迫る。


地球の超高層大気から周辺の宇宙空間まで広がる領域はジオスペース (Geospace) と呼ばれ、電離圏・磁気圏とも呼ばれてきました。この領域には、様々な実用・科学人工衛星や国際宇宙ステーションに代表される無数の宇宙機が配置されており、もはや現代社会にとって必須の社会基盤が展開する世界です。この身近な宇宙空間では、太陽コロナから流出する太陽風プラズマと、地球大気プラズマ・中性大気、地球固有磁場、下層大気などが複雑に作用していて、地球極域にはオーロラが出現し、静止軌道付近では宇宙嵐と呼ばれる大規模変動が引き起こされています。また、宇宙空間を満たすプラズマと惑星磁場、中性電離大気の相互作用は、太陽系内のみならず遠方宇宙でも基礎的かつ普遍的な素過程であることが分かってきています。我々にとって最も身近で詳細な探査が可能な地球、あるいは多彩な太陽系内惑星の超高層大気や周辺の宇宙空間で生起している壮大な自然現象とその変動過程を実証的に解明することは、宇宙開発への学術的貢献という枠を越え、宇宙・地球・惑星に関する基礎的・普遍的理解につながります。

我々の研究室では、最先端の科学観測機器を独自に開発し、海外・国内での拠点型・ネットワーク型の地上フィールド観測と宇宙空間に展開する探査機を用いた直接観測を両輪とした観測的・実験的研究を行い、この領域における自然現象の成因・機構に迫ります。

### 電磁気圏の実証的研究のための4つの戦略

壮大なオーロラ嵐・宇宙嵐が生起する電離圏・磁気圏における多様な物理現象に対して、実証的研究を多面的に展開するため、我々の研究室では次の4つの観測的・実験的戦略を基軸にしています。

1. 宇宙探査機・超小型衛星・観測ロケットなどによる将来計画を立案・推進し、それらに搭載する宇宙空間プラズマ・惑星中性大気の粒子分析器を開発し、観測データの解析を通して、宇宙と地球・惑星の結合機構を実証的に研究しています。
2. 北欧において、大型のレーダー装置を含む各種レーダー、ナトリウムライダー、ファブリペロー干渉計、全天カメラなどを用いた国際協力による拠点観測を実施しています。
3. 北極圏から日本、赤道域にわたる広い範囲で、可視域の分光機器や電波機器による世界に類を見ない国際ネットワーク観測を展開しています。
4. 高速変動するオーロラを世界最高速の地上・衛星搭載装置で極限時間分解能観測し、宇宙起源の高エネルギー電子がもたらす地球超高層大気・中層大気への影響を研究しています。



(1)



(2)



(3)



(4)



(5)




(6)



(7)

**宇宙探査計画の立案・推進、宇宙機搭載用観測器の開発と観測データの解析により、宇宙と地球・惑星の結合機構を実証的に研究しています。(平原グループ)**


宇宙空間と地球・惑星環境との間に生起する多様な自然現象に関して、それらの素過程や物理機構間の相互作用を解明するには、探査機やロケットなどの飛翔体を用い、その場で直接観測することが不可欠です。本研究グループでは、研究所最上階にあるクリーンルーム内の装置により宇宙空間に近い環境をつくり出し、宇宙探査機に搭載する観測機器の研究・開発を行っています。宇宙と地球・惑星の結合系で最も基本的な構成要素としての宇宙プラズマ・中性粒子を、飛翔体に搭載された分析器で直接計測するためには、研究・開発の段階において地上で十分に実験・試験を行うことが必要となるため、それに必要なビームラインなどの様々な装置・設備の構築も行っています。これらの分析器で取得された観測データを解析することで、宇宙と地球・惑星の境界領域での物理機構を実証的に研究しています。



将来探査計画の立案・推進、独自設計・試作による分析器の新規開発、クリーンルーム・ビームラインなどの較正実験施設の構築・運用を行っています。

### 電波・光学機器を用いた国際ネットワーク観測による超高层大気の研究を行っています。(大塚グループ)

太陽から放射されたエネルギーの一部は、磁力線を介して極域の超高層大気に流入し、オーロラをはじめとする電磁気的な変動をもたらします。この影響で励起された大気波動は中低緯度にまで伝搬するなど、超高層大気に全球規模の変動を引き起します。本研究グループでは、超高層大気が発する「大気光」とよばれる微かな光の観測を行うため、超高感度カメラを国内だけでなく世界の十数ヶ所に設置し、全球規模で起こる超高層大気現象の解明に取り組んでいます。また、赤道域では磁力線が水平になるため、赤道域特有の現象が発生します。この現象を捉えるため、赤道直下のインドネシアにVHF帯のレーダーを設置し、電離圏プラズマの擾乱現象の観測を行っています。電離圏プラズマ擾乱は、カーナビでお馴染みのGPSにも悪影響を及ぼすことがあります。これは、GPS衛星から送信された電波は、地上で受信されるまでに電離圏を通過するため、電波の受信障害が起こるからです。私たちは、世界各地のGPSデータを利用して、電離圏の研究を行うとともに、電離圏による受信障害の影響を軽減する研究を行っています。



大気光やGPS、レーダー観測により超高层大気を研究しています。

**北欧におけるレーダーやライダー等の拠点観測により、太陽風エネルギーの散逸過程の解明および大気上下結合の解明を目指しています。(野澤グループ)**

本研究グループでは主に観測に基づいて研究を進めしており、その中心的な観測装置は、北欧にて稼働している歐州非干渉散乱(EISCAT) レーダーと呼ばれる地球物理学研究用の世界最高水準のレーダー群です。EISCAT レーダー観測と組みあわせて、人工衛星・ロケットなどの飛翔体や、他のレーダー(分反射レーダー、流星レーダー)、光学機器などとの同時観測による総合的な観測を行い、物理現象の理解に取り組んでいます。特に最近は、ナトリウムライダーを用いた、高度80–110km付近の大気温度変動や風速変動の観測研究に力を入れています。大気重力波の散逸過程、ジュール加熱量の定量評価、大気安定度、大気上下結合等の研究を修士学生のテーマとしています。観測地の中心となるのは、ノルウェー北部のトロムソとロングイアビンです。毎年複数回、現地に赴き観測を行います。このEISCAT レーダーおよびナトリウムライダー観測には、スタッフだけでなく、海外フィールド実習の一環として、大学院生も参加しています。



EISCAT レーダーとナトリウムライダー発振機

### 宇宙起源の高エネルギー電子が引き起こす地球超高层大気・中層大気変動の解明に取り組んでいます。(大山グループ)

オーロラは磁気圏で加速された電子が高度100–300km付近の地球超高层大気を励起することで発生します。このオーロラ電子は、その起源である太陽風プラズマ中の電子より  $10^2$  ~  $10^3$  倍以上高いエネルギー(1–10 keVオーダー)を持つことが分かっていますが、加速機構を始め、時間変動や空間分布など十分に理解されていない物理現象がまだ多くあります。さらに最近の研究により  $10^5$  倍に近いエネルギー(数百keV)を持つ高エネルギー電子降下(EEP)が存在し、上部成層圏での電離が観測実証されました。これはEEPの大気微量成分(オゾン等)への影響、ひいては、より下層の大気とオーロラ活動との関係を調べることの重要性を示唆する結果です。EEPの生成機構、オーロラの時間変動や空間分布とEEPとの関係、EEPの超高层大気・中層大気へのインパクトなど、重要課題の解明を目指し、世界最大級の超高层大気観測レーダーであるEISCAT、極限時間分解能を可能にするEMCCDカメラとファブリペロー干渉計、波動粒子相互作用や粒子衝突過程の直接測定を目指す衛星を用いた観測実験を行います。これらの研究活動は日本・フィンランド・米国を中心とする国際共同プロジェクトとして推進しています。




(左上) EISCAT レーダー  
(左下) 国際共同研究チーム  
(右) EEP を伴うオーロラ

写真の説明: 左より、(1) 教職員の集合写真、(2) 5方向に照射されるナトリウムライダーレーザー、(3) 2種類のエネルギー帯域用の電子・イオンビームライン較正実験装置、(4) ロングイアビンに設置されているEISCAT42mアンテナ、(5) インドネシアでの全天カメラの設置風景、(6) クリーンルームでの作業風景、(7) フォトメーターの較正実験風景

Webページ: <https://www.isee.nagoya-u.ac.jp/study03.html>  
連絡先: hirahara@nagoya-u.jp (平原)





草野 完也 教授

増田 智 准教授

家田 章正 助教

## 太陽活動と宇宙環境のダイナミクスを最先端のシミュレーションと最新の観測データ解析から理解し予測することで、太陽宇宙環境の全体像を明らかにします。



我々が生きる星「地球」は孤立した天体ではありません。地球とその周辺の空間（ジオスペース）は母なる星「太陽」と強くつながり、一つのシステムを形作っています。それ故、地球は太陽と宇宙の影響を絶えず受けているのです。太陽宇宙環境物理学研究室（SST研）は、太陽と地球の織りなすこの広大なシステムの謎を探ることができると世界的にも数少ない研究室です。SST研では最新の観測データと最先端のスーパーコンピュータを駆使したシミュレーションの融合によって、太陽宇宙環境を多角的に解き明かすことを目指しています。その研究は太陽ダイナモ、フレア爆発、太陽風、オーロラ、宇宙嵐まで多岐に渡ります。

GPSや衛星通信などにより宇宙利用が人々の生活を支える現代社会では、太陽宇宙環境の変動を予測する宇宙天気予報の重要性が高まりつつあります。SST研では太陽フレア爆発や放射線帯の変動、磁気嵐の予測を目指した太陽宇宙環境の予測研究を本格的に行うことができます。また、太陽活動と長期的な気候変動の関係を理解する宇宙気候研究も進めることができます。基礎から応用まで多岐にわたる研究テーマを選ぶことはSST研の魅力の一つです。さらに、その研究活動は国際的に広がり、修士課程から国内はもとより国際学会で活躍するチャンスも用意されています。以下では、SST研で進められている研究の一端を紹介しましょう。

### 母なる星、太陽の謎に迫る


太陽は我々の生活と地球環境に最も深く関係した天体でありながら、未だに多くの謎に満ちています。太陽黒点の変動、太陽系最大の爆発現象である太陽フレアの発生機、太陽を取り巻くコロナを100万度以上に加熱するメカニズム等は、現在も未知のままであります。SST研では、「ひので」などの観測衛星や野辺山電波ヘリオグラフ等による最新の観測データと、京コンピュータなどのスーパーコンピュータを使った大規模シミュレーションを連携させ、こうした太陽の謎に挑んでいます。フレアと大規模なプラズマ放出の発生メカニズムを衛星観測と電磁流体力学シミュレーションによって初めて明らかにすると共に、コロナ加熱を微小なフレアの集積によって説明するための新たな研究を進めています。また、将来の黒点活動を太陽磁场観測に基づくシミュレーションによって予測する研究も進めています。

大学院生のみなさんは、電波・可視光・X線等の多波長データ解析や観測データを取り込んだ精密シミュレーション等を用いて、太陽の歴史的謎に迫る研究を手がけることができます。





### ジオスペース高エネルギー粒子環境の研究

地球周辺の宇宙空間であるジオスペースには、エネルギーが高い電子やイオンが大量に存在するヴァン・アレン帯（放射線帯）と呼ばれる領域があります。このヴァン・アレン帯の荷電粒子が変動するメカニズムを、「あらせ」衛星を中心とした人工衛星や地上観測のデータ解析、シミュレーションを組み合わせて研究します。また、荷電粒子の変動を高い精度で予測するために、観測データとモデルの同化に関する研究も進めています。



### 太陽地球圏環境の予測研究

太陽地球圏環境で生じる様々な変動現象は人間生活にも重大な影響を及ぼします。それらを科学的な理解に基づいて正確に予測することは、安全な社会を守るためにも重要です。太陽宇宙環境物理学研究室では、太陽地球圏環境の予測研究を全国の研究者と共に推進しています。特に、太陽表面磁场観測に基づく太陽フレア発生の数値予測、3次元電磁流体力学シミュレーションによるコロナ質量放出とそれによる惑星間空間磁场の変動予測、波動と粒子の相互作用の精密な理解に基づく放射線帯電子の変動予測、太陽周期の機構解明と黒点活動予測などを最新の計算モデルと精密な観測データ解析に基づいて進めています。



コロナ質量放出による惑星間磁场変動の予測シミュレーション



写真の説明：左より、(1) 研究室全体集合写真、(2) 研究所一般公開で研究紹介を行う大学院生、(3) 国際会議（ロシア）で研究発表を行った大学院生、(4) 熱心に議論を行う大学院生

Webページ：<https://is.isee.nagoya-u.ac.jp/>  
連絡先：kusano@nagoya-u.jp（草野）



### 太陽宇宙環境の包括的な総合解析研究

太陽・惑星間空間・地球磁気圈・電離圏からなる太陽宇宙環境では、プラズマと電磁場の相互作用を通して太陽フレアによる爆発的エネルギー解放や太陽風の加速、太陽風と地球磁気圈の相互作用による磁気嵐や放射線帯の変動、オーロラなど様々な非線形現象がダイナミックに発生しています。太陽宇宙環境物理学研究室ではこうした多様な現象を従来の学問分野の垣根を超えて包括的に理解する研究を行っています。また、磁気リコネクション、衝撃波、波動と粒子の相互作用、プラズマ不安定性など色々なプラズマ現象の基礎研究も進めています。



向かって左から 風間慎吾 准教授\*、三宅美沙 准教授、田島宏康 教授、奥村暁 講師、松原豊 准教授、小林雅俊 研究員、高橋光成 特任助教、伊藤好孝 教授、大橋健 研究員、毛受弘彰 助教

\* 素粒子宇宙起源研究所 所属

## 宇宙線物理学は、宇宙物理、素粒子・原子核物理、地球物理の3分野にまたがる学問です。宇宙の極限環境での物理、宇宙線に影響を受ける地球環境を研究の対象とします。


宇宙線は英語で cosmic rays と言われます。私達の研究室の略称 CR はこの頭文字をとっています。宇宙線は、宇宙から地球に降り注いでいる放射線で、Hess は 1912 年にこれを発見し、1936 年にノーベル物理学賞を受賞しました。宇宙線の主成分は陽子であり、電子や原子核などの荷電粒子や、ガンマ線などの高エネルギー光子やニュートリノも含みます。宇宙のどこかで生まれた宇宙線は、星間磁場や太陽・地球の磁場による影響を受けながら地球へ到達します。

宇宙線の起源は完全には解明されていません。太陽中性子の観測や宇宙ガンマ線の観測により宇宙線の起源を解明し、地球近傍のプラズマや太陽の表面、あるいは超新星残骸など宇宙プラズマにおける粒子加速機構を理解することが、CR 研での研究のひとつです。

宇宙線は、かつては陽電子、中間子の発見、最近ではノーベル賞を受賞したニュートリノ振動の発見など、天然の素粒子実験の場として大きな役割を果たしてきました。CR 研では、LHC 加速器での超高エネルギー宇宙線衝突の研究や、ニュートリノ・暗黒物質の研究など、宇宙と素粒子にまたがる謎にも挑んでいます。

宇宙線は地球大気に突入して電離を起こし、また原子核反応により放射性炭素 14 などの宇宙線生成核を作り出します。宇宙線を調べることで、地球周辺の磁場の様子や変動の歴史をることができます。CR 研では、年輪中炭素 14 の測定などを通じて、宇宙線と太陽・地球との関わりを探っています。

宇宙線は、ユニークな素粒子実験の場を提供し、宇宙の高エネルギー現象について情報をもたらします。また、磁場に影響される宇宙線は太陽地球環境を調べるプローブにもなります。この様に宇宙線の研究は素粒子・原子核物理、宇宙物理から地球物理まで幅の広い領域にまたがっており、我々の研究室にも様々な研究テーマがあります。



### 宇宙線加速機構の解明

宇宙線は、陽子やヘリウム、鉄の原子核等が、「なんらかの」加速機構で、非常に高いエネルギーまで加速された粒子で、その起源は宇宙物理学上の大きな謎となっています。高エネルギー宇宙線やガンマ線の観測によりその起源を解明し、その加速機構を理解することが、宇宙線研究の主目的のひとつです。ガンマ線は、宇宙線と星間ガスの相互作用で生成され、荷電粒子と異なり星間磁場で進行方向を曲げられることはありません。そのため、ガンマ線観測は宇宙線の加速現場を研究する有力な方法です。2008 年に打ち上げられたフェルミ・ガンマ線宇宙望遠鏡による 10 億電子ボルトエネルギー帯のガンマ線観測で得られたスペクトル解析により、W44、IC 443 などの超新星残骸で、宇宙線加速の決定的な証拠をつかむことができました。同時に、次世代のガンマ線観測装置であるチレンコフ・テレスコープ・アレイ (CTA) のカメラを開発しています。CTA によって超新星残骸における宇宙線加速機構や、銀河系外の宇宙線起源に関する研究をさらに進めていきます。

上述のような粒子加速は、宇宙のいたるところに存在するプラズマが起こす普遍的な現象で、地球近傍や太陽の表面でも、スケールこそ違え同様の現象が起こっています。太陽表面は我々に最も近い宇宙線源であり、太陽フレアと呼ばれる爆発現象に伴い粒子加速が起こっています。この時放出される太陽中性子を測定することで、粒子加速の現場を捕らえることができます。メキシコの高山に新たな太陽中性子検出器を設置して観測を進めているほか、太陽中性子を観測できる機器を搭載した超小型衛星の開発も進めています。



(左) CTA 小口径望遠鏡の除幕式。CR 研で開発した信号処理回路を採用している。  
(右) メキシコ・シェラネグラ山頂の太陽中性子望遠鏡

### 宇宙線と太陽活動との関連の研究

太陽の磁場活動は、11 年の周期変動や数十年にわたる低調期の存在など、長期的には様々な変化が知られています。また、太陽は時に超巨大な太陽面爆発を引き起こすこともあります。このような太陽の活動は、地球に到来する宇宙線強度に影響します。私達は樹齢 2000 年の屋久杉の年輪に含まれる放射性炭素 14 や、南極の氷床コアに含まれるベリリウム 10 など宇宙線生成核の濃度変化を測定し、宇宙線強度の履歴から過去の太陽活動を復元する研究を行っています。

### 超高エネルギー宇宙線の謎を解明する LHCf 実験

これまで最も高いエネルギーを持つ 10 の 20 乗電子ボルトの宇宙線が空気シャワーの観測から発見され、大きな謎を呼んでいます。これは人類が加速器で生成可能なエネルギーの何桁も上です。いったい宇宙のどこでこのような粒子が生まれているのでしょうか？

超高エネルギー宇宙線の観測では、宇宙線が大気中で反応して生成する 2 次粒子のシャワーを測定しています。しかし、超高エネルギーでの宇宙線の反応は実験データが無くよく分かっていません。私達は 2009 年にいよいよ稼働を始めた世界最高エネルギーの陽子衝突型加速器、ラージハドロンコライダー (LHC) に小さな検出器を組み込み、超高エネルギー宇宙線の反応を実験的に調べる「LHCf 実験」を推進しています。ここで得られる素粒子実験データは、宇宙線観測の精度を上げ、加速器では実現不可能なもっと高いエネルギーの現象を宇宙線によって探る糸口となるでしょう。

### ニュートリノによる物質の起源の理解

「ニュートリノはなぜこんなにも軽く、またニュートリノ振動を起こすのか？」ニュートリノの持つ不思議な性質は、宇宙と物質に起源の謎に関わっていると考えられています。

ニュートリノは、ほとんど物質と反応しないため地下深くまで届きます。ニュートリノで宇宙を見れば、例えば太陽の中心で起こっている核融合や銀河の中心を見通す事ができます。私達は神岡鉱山にある巨大ニュートリノ実験スーパークミオカンデで、ニュートリノの不思議な性質を探ると共に、さらに 10 倍の大きさを持つハイパークミオカンデ計画の実現に向けて開発研究を行っています。

### 暗黒物質の探索

宇宙の全質量の大部分は説明のつかない物質「暗黒物質」で担われていることがわかっています。

暗黒物質の正体や性質については、まだ理論的・実験的な制限が十分でないため、我々は宇宙観測や地下実験など様々なアプローチで探索しています。

宇宙観測においては、暗黒物質が集積している場所において対消滅して生成されるガンマ線を検出することで、暗黒物質の証拠を掴むことができます。ガンマ線衛星・フェルミでは、通常の物質に対する暗黒物質の存在比が非常に高い(1000 以上になる場合もある)と考えられている矮小精円体銀河と呼ばれる銀河系近傍の天体からのガンマ線を探査しましたが、暗黒物質の証拠は見つけられませんでした。この結果は、陽子の 100 倍程度までの質量を持つ暗黒物質が存在しないことを示唆します。さらに、陽子の 1 万倍程度までの質量の暗黒物質を検出する能力をもつ地上チレンコフ望遠鏡の次世代装置 CTA の開発・建設に取り組んでいます。

スーパークミオカンデでは、太陽や銀河中心に集積した暗黒物質が対消滅して生成する高エネルギーニュートリノを探索しています。

また地下実験では、検出頻度の低い暗黒物質が液体キセノン通り抜けた痕跡をつかもうとしています。イタリア・グランサッソ地下研究所で行われている、暗黒物質探索実験 XENONnT 実験で暗黒物質を探しながら、さらに大型の将来計画 DARWIN 実験に向けた新しい検出器開発を行っています。

私達は人工衛星、地上、地下深くから宇宙を観測し、暗黒物質の正体を明らかにしたいと考えています。



(左上) LHC 加速器で超高エネルギー宇宙線の衝突を研究する LHCf 実験。(左下) 屋久杉年輪中の放射性炭素 14 から、過去の太陽活動や宇宙線増加を研究する。(右上) 神岡地下のニュートリノ実験スーパークミオカンデ (写真提供 東京大学宇宙線研究所 神岡宇宙素粒子研究施設) (右下) 次世代の暗黒物質探査実験 XENON-nT (Credit: Roberto Corrieri and Patrick De Perio)

写真の説明: 左より、(1)LHCf 検出器完成を祝う CR 研メンバー、(2) 雲核形成に関するビーム試験に取り組む学生、(3) 新型液体ゼンコン検出器の開発に取り組む学生、(4) 放射性炭素 14 測定のため木を切る学生、(5) MOA II 専用大面積(8 千万画素) CCD カメラと学生

Web ページ: <https://www.isee.nagoya-u.ac.jp/CR/>  
連絡 先: itow@isee.nagoya-u.ac.jp (伊藤)





徳丸 宗利 教授



岩井 一正 准教授



藤木 謙一 助教


## 独自に開発した大型電波望遠鏡を用いた観測から、宇宙天気や地球環境に大きな影響を与える太陽風の謎を解明する。

太陽と地球の間は物質が存在していないように見えますが、実は太陽から吹き出す超高温のプラズマの流れで満たされています。このプラズマ流は太陽風 (Solar Wind) と呼ばれます。太陽風は超音速のスピードで太陽から常時四方八方へ拡がり、太陽系の惑星すべてを包み込んでいます。そして、太陽風は地球軌道半径の約 100 倍の距離で恒星間を流れるガス流と接していると考えられています。太陽風が星間ガスの中に作る空間が太陽圏 (Heliosphere) です。

太陽圏では、太陽の磁気活動を反映して激しい変動が絶えず起こっていて、それらは地球周辺の宇宙環境に大きな影響を与えています。太陽風によって時々刻々変化する宇宙環境の状態は、最近では宇宙天気 (Space Weather) と呼ばれ、注目されるようになりました。それは、人工衛星や無線通信、電力設備が宇宙天気によって深刻な障害を受けることがあるからです。また、太陽風の影響は地表近くまで及んでいることも知られており、地球の気候変動との関連性も示唆されています。したがって、太陽風についてより正確な理解が重要になっています。太陽風と類似した現象 (恒星風) は他の天体でも見つかっており、多くの天体がもつ共通の性質と考えられます。太陽風は、こういった宇宙に普遍的な現象を間近で観測することができる利点があります。私たちの研究室では独自に開発した観測装置（大型電波望遠鏡群）を使って太陽風を地上から遠隔測定し、その 3 次元構造や生成機構・太陽活動に伴う変動現象の研究を行っています（研究室の略称 SW は、Solar Wind の略）。

### 惑星間空間シンチレーションによる太陽風の観測

太陽風は非常に高温（約 10 万度）ですが、その密度は極めて低い（地球軌道で粒子数は  $1\text{cm}^3$  あたり 10 個程度）ため、それ自体が放射する電磁波を捉えることはできません。よって、太陽風を観測するには探査機を用いるのが一般的です。しかし探査機による観測は 1 点でしかなく、限られた数の探査機では広大な太陽圏の全貌を明らかにすることはできません。そこで私たちが観測に用いているのが、天体電波源の“またたき”現象を用いる方法です。この“またたき”現象は、惑星間空間シンチレーション (Interplanetary Scintillation; IPS) と呼ばれ、太陽風中にあらわるプラズマ密度のゆらぎによって生じます。太陽風の密度ゆらぎによって発生した電波強度の変動パターンは、太陽風の流れに伴って地上を動いていくので、この強度変動パターンを地上に配置した複数のアンテナで同時に観測してやると、太陽風の速度が測定できます。また、IPS の強さは太陽風プラズマの密度に関する情報を与えてくれます。IPS 観測には、探査機による観測と比べ優れた点がいくつかあります。まず、高感度の電波望遠鏡を用意すれば多くの天体電波源について IPS 観測をすることができます。広大な太陽圏の全域をモニターしながら、変動現象を効率よく検出することができるのです。さらに、IPS 観測は探査機では観測が困難な太陽のごく近傍や高緯度の太陽風を測ることができます。



惑星間空間シンチレーションによる太陽風観測



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

### IPS 観測専用の多地点大型電波望遠鏡システムの開発

SW 研究室では、独自に IPS 観測専用の大型電波望遠鏡システムを開発し、太陽風データを収集しています。それらの電波望遠鏡は豊川（愛知）、富士山麓（山梨）、木曽（長野）の国内 3箇所に設置されています。これらの望遠鏡は、いずれも我が国最大級の受信面積を有しています。例えば、富士の電波望遠鏡の受信面積は約  $2000\text{m}^2$ 、豊川にある新しい電波望遠鏡は約  $3500\text{m}^2$  です。何故このような面積が必要なのかというと、元々天体電波源からの信号は非常に微弱で、IPS のシグナルは電波源自体の信号に比べさらに小さいため、それを検出するには高感度の受信システムが必要だからです。また IPS は速い変動を示すことから時間積分によって感度を向上させることができません。SW 研究室の高感度な電波望遠鏡では、1 日に数多くの電波源について IPS 観測が可能です。また本望遠鏡の高感度な特性を活かし、最近ではパルサーの観測も行っています。


また、SW 研究室では、将来の IPS 観測をリードするべく、新しい大型電波望遠鏡の建設を計画しています。この将来装置では、既存の装置の 10 倍の性能を目指して、最新の技術を導入する予定です。現在は、多方向を同時に観測できるデジタルフェーズドアレイ装置のプロトタイプを開発し、信号処理の実験を行っています。また、観測に適したアンテナ形状の設計も行っています。これらの設計開発は研究室のスタッフや大学院生が協力して行っています。自分たちが考えたアイディアによって装置が出来上がっていく過程を体験できることも本研究の魅力の一つです。



豊川に建設された UHF 電波望遠鏡 (SWFT)

### CT 解析による太陽風 3 次元構造の復元


SW 研究室が持っているもう一つのユニークな技術は、IPS 観測データによる太陽風の CT 解析です。CT とは計算機トモグラフィー (Computer-assisted Tomography) の略で、医療分野での応用が有名です。IPS 観測で得られる太陽風データは視線に沿った積分値ですが、SW 研究室で開発した CT 解析法を使うと、IPS 観測で得られたデータから太陽風の 3 次元構造が復元できます。これまでの研究から、CT 解析によって得られた結果は飛翔体による観測ともよく一致していることが示され、その信頼性の高さが確認されています。この CT 解析は SW 研究室の研究に活用され、次に述べる太陽風生成機構や惑星間空間擾乱、宇宙天気予報の研究でいくつもの成果を生んできました。



太陽活動 11 年周期に伴う太陽風速度分布の変化 (Tokumaru, 2013)

### 太陽風生成機構の研究


太陽風の生成機構は、未だ解明されていない大きな謎です。現在研究者を悩ませているのは、太陽風を駆動するエネルギーがどこからくるかという点です。最初、太陽風は 100 万度以上のコロナの持つガス圧により太陽の重力を振り切って流出するというモデルが提唱されました。しかし、その後の研究からコロナのガス圧では太陽風を説明できないことが判っています。特に、コロナホールと呼ばれる低温・低密度領域からより高速な太陽風が吹き出すという観測事実は説明が最も難しい点です。この他、太陽風が  $300\text{-}400\text{km/s}$  の低速成分と  $700\text{-}800\text{km/s}$  の高速成分で構成されるという性質 (2 成分性) の原因、太陽風がどこでエネルギーを得て超音速になるかという加速場所の問題、低速風の発生源はどこかという問題など、太陽風生成機構に関する謎は尽きません。SW 研究室のこれまでの研究からは、太陽の磁場特性が太陽風加速を大きくコントロールしていることが判ってきています。



太陽風流源面における速度分布  
(上) と光球面磁場 (下) の関係。  
上下をつなぐ線はコロナ磁場の  
磁力線を示す。  
(Tokumaru, 2013)

### 宇宙天気予報の実用化に向けた研究

太陽表面での爆発現象は太陽大気の一部を宇宙空間に向けて吹き飛ばします。この現象はコロナ質量放出 (Coronal Mass Ejection; CME) と呼ばれ、地球周辺に到来すると電波通信や人工衛星・航空機の航行、GPS 測位など、社会生活に様々な影響を与えるため、到来前に予報することが重要です。しかし、CME が惑星間空間でどう分布し、どの様に伝搬するかについては、まだよくわかっていない。IPS 観測は惑星間空間を伝搬中の CME を効率良く検出することができます。SW 研究室では宇宙天気予報を行う研究機関と共同で IPS 観測データを取り込んだ CME 伝搬モデルの開発を行っています。これまでの研究から、IPS 観測データを取り込むことで CME の到来予測精度が向上することが明らかになっていました。現在、このモデルを用いた宇宙天気予報の実用化に向けた開発が進められています。



実用化に向けて開発が進む IPS データを取り込んだリアルタイム太陽圏シミュレーション (iwai et al, 2019)


### 特異な太陽活動に伴う太陽風の変動に関する研究

現在の太陽活動は、過去 100 年来と言われる低いレベルになっています。17 世紀にも太陽活動が長期間低下した時期（マウンダー極小期）があり、その期間には地球の気候が寒冷化したことなどが知られています。しかし太陽活動と地球寒冷化のメカニズムは未だよく判っておらず、Missing Link とも呼ばれます。今回の太陽活動の低下に伴って、どんな変化が地球周辺に生じるかは、Missing Link を解明する重要な手がかりとなります。最近の IPS 観測からは、太陽風の分布や特性が過去とはかなり異なっていることが判ってきました。SW 研究室では、太陽風が今後どのように太陽風が変化してゆくかを IPS 観測から正確に捉えることで、Missing Link の謎に迫りたいこうとしています。

写真の説明：  
左より (1) 研究室メンバー、(2) 木曽観測施設における一般公開の様子、  
(3) セミナー中の様子、(4) 開発中の次世代装置の一部、(5) 豊川における  
パルサー観測のデータ処理、(6) 豊川観測所での保守・調整作業

Web ページ：<https://stsw1.isee.nagoya-u.ac.jp/>  
連絡先：k.iwai@isee.nagoya-u.ac.jp (岩井)





塩川 和夫 教授

西谷 望 准教授

能勢 正仁 准教授

Claudia Martinez-Calderon 准教授

中島 拓 助教

## 地球周辺の宇宙空間と超高層大気を観測的に研究し未知の現象の発見とその原因の解明・人類の宇宙利用への応用をめざす。

本研究グループは、地球周辺の宇宙空間（ジオスペース）とそれにつながる超高層大気の変動を観測的に研究しています。この領域は、太陽からのプラズマが地球の磁場にとらえられて磁気圏を形成し、さらに大気に降り込んでオーロラを光らせたり大気を加熱したりする上からの過程と、対流圏などの下層大気からの波のエネルギーが超高層大気に伝わって変動を引き起こす下からの過程があり、この上下からのエネルギー流入によって常に変動しています。私たちの研究は、この領域で発生している未知の現象の発見とその原因の解明という理学的な側面と、人類の宇宙利用への応用という工学的な側面があります。

研究手法として、オーロラなどの大気発光の高感度分光機器、大型レーダー、レーザーレーダー、GPS受信機、磁力計、VLF電波アンテナ、ミリ波・サブミリ波分光計、人工衛星の搭載機器などを開発し、観測に基づいた研究を行っています。これらの機器を国内・海外のフィールド観測点に設置し、地球規模のグローバルな研究を国際協力のもとで行っているのも特徴です。私たちの研究室は、工学系の学生と理学系の学生と一緒に研究をしているユニークな研究室です。さらにフィールド観測のために海外の観測点に出張することがあるとともに、国際共同で世界最先端の研究をしているので留学生や外国人の客員研究者が研究室に滞在するなど、国際的な研究環境となっています。


### オーロラや電磁場観測を通じた電磁気圏の研究

オーロラはジオスペースのプラズマが大気に衝突して大気が光る現象です。プラズマは目に見えませんが、オーロラを通して地球周辺のプラズマの動きを画像としてとらえることができます。またオーロラは電磁気圏に様々な電磁場変動を引き起します。サブストームと呼ばれるオーロラが爆発的に活動する現象や、周期的に点滅するオーロラなど、オーロラに関連する地球周辺のプラズマ現象には、まだまだ未知な点が多いのです。オーロラは超高層大気を加熱し、その高度の大気の地球規模の変動を引き起こし、人工衛星の軌道を変えることもあります。

私たちは、カナダやノルウェーでオーロラの高感度分光観測や関連する磁場・電場・波動・大気変動の観測を行い、オーロラに関するジオスペース・超高層大気の現象を研究しています。またオーロラを引き起こすプラズマを人工衛星から直接計測する粒子分析器の開発も行っています。



カナダで観測されたオーロラ




(1)



### 中緯度の超高層大気・電離圏の研究


高さが80km以上の間圏・熱圏と呼ばれる超高層大気や電離圏にはいろいろな空間波長を持つ波動が昼夜の別なく存在しています。例えば水平波長が1000km以下の電離圏の波動を“MSTID（中規模伝搬性電離圏擾乱）”と呼びます。私たちは、夜間大気光（高度80～300kmの大気が夜間に発光する現象）を測定するための全天カメラを国内の4点とオーストラリア、インドネシア、タイ、カナダ、ロシア、ノルウェー、ハワイなどに設置して、MSTIDなどの大気波動をイメージング観測しています。また、高度約2万kmを飛翔するGPS衛星が発射する2周波の電波を地上で受信して、電離圏の電子密度のイメージング観測をしています。さらに国際宇宙ステーションから大気光を観測するプロジェクトにも参加しています。これらの観測を通して、超高層大気や電離圏の変動を研究しています。これらの超高層大気・電離圏の変動は、人工衛星-地上間の通信に影響を与えること、GPSの測位精度を落としたりして、宇宙空間を利用した人類活動にも影響を与えます。



同じ時刻の大気光観測（左）とGPS観測（右）から得られた、日本列島の上空を北東から南西へ伝搬するMSTID

### 地上と衛星の磁場計測器による磁気圏環境の研究

地球の持つ固有磁場は、人工衛星が飛翔する宇宙空間にまで張り出して磁気圏を作っています。地上や人工衛星で磁場を計測していると、その大きさや向きが非常に激しく変化する“磁場双極子化”という現象や、きれいな正弦波の変化を示す“地磁気脈動”が観測されます。私たちは、磁場双極子化が起こると磁気圏のプラズマが加熱され、特にの中でも酸素イオンだけに選択的に働きかけるメカニズムがあることを発見しました。また、地磁気脈動がある条件を満たすときに、プラズマの運動と共に共鳴を起こし、プラズマの加熱が起こることも分かってきました。このように磁気圏の環境は磁場の変化によって大きく左右されるため、その物理メカニズムの解明や磁気圏環境のモニターという観点から磁場観測やデータ解析による研究を行っています。また、新しい原理を用いた磁場センサーを用いて、地磁気計測・記録システムの開発も進めています。



(左)磁気圏で観測された磁場双極子化現象とそれに伴う水素プラズマと酸素プラズマの加熱の様子。(右)現在開発中の地磁気計測システムのセンサー部分

### 大型短波レーダーによる電離圏・熱圏変動の研究

電離圏のプラズマは激しい擾乱状態になることがあります。私たちは大型レーダーを使って乱流の研究を行っています。強力な電波を上空に発射し、乱流プラズマで散乱されたレーダーエコーを調べることにより、乱流の生成機構や無線通信などへの影響を知ることができます。また私たちは、南北両半球に多数設置されている大型短波レーダーを用いて、高・中緯度電離圏内のプラズマの運動の研究を行っています。特に2006年11月と2014年10月には北海道陸別町に二基の大型短波レーダーを設置し、継続的な観測を行っています。このレーダーは、從来から観測空白域となっていた北海道からシベリア、アラスカに至る広範囲の電離圏や下部熱圏を探査することができる世界的にもユニークなものであり、中緯度電離圏と高緯度電離圏が力学的・エネルギー的にどのように結合しているかを研究するための新しい観測手段となります。



北海道-陸別短波レーダーの巨大なアンテナ群

### ミリ波ラジオメータによる中層大気微量分子の研究

地球大気の大部分（約99%）は窒素と酸素から成りますが、それ以外の成分（大気微量成分といいます）も地球環境の成り立ちに深く関連しています。私たちは、南極や南米、北欧など世界5か所に展開したミリ波ラジオメータ（電波分光観測装置）による地上からのリモートセンシングにより、成層圏から中間圏（高度約10～80km）の大気に含まれる様々な微量分子を長期的に観測して、地球大気組成変動に対する人間活動の影響のほか、太陽活動やオーロラなど自然現象の影響について明らかにすることを目指しています。また、超伝導金属を用いた量子雑音限界に迫る高い感度を持つ検出器や、超高周波電波を低損失に伝送できる立体導波管回路による新たな観測技術の研究や観測システムの開発も行っており、これは大気環境計測だけではなく電波天文學分野などへの幅広い応用を目指しています。



ノルウェーに設置したミリ波ラジオメータの外観（左）。大学院生と共に設計開発を行った超伝導検出素子（右上）および導波管型周波数分配器（右下）



写真の説明：左より、(1)教員の集合写真、(2)カナダ・Nain 観測点でのオーロラ観測、(3)高感度全天カメラの較正実験、(4)ミリ波帯超伝導検出器の開発実験装置、(5)オーロラ電波を観測するアンテナのケーブル設置作業（カナダ）、(6)陸別HF第一レーダーサイト前での集合写真

Webページ：<https://www.isee.nagoya-u.ac.jp/dimr/>  
連絡先：shiozawa@nagoya-u.jp（塩川）





三好 由純 教授



梅田 隆行 准教授

## 情報学的手法に基づく太陽地球系科学及び宇宙プラズマ科学の研究により、宇宙地球環境の変動を解明し、宇宙の天気を予測する。

情報学的手法を用いた大量の人工衛星データや画像の解析処理やデータ同化及び、スーパーコンピュータを用いた超並列計算機シミュレーションなどのアプローチにより、ジオスペースおよび太陽地球惑星系の環境変動を数理的に研究しています。各教員は他の研究グループと協力して太陽地球系科学及び宇宙プラズマ科学の研究を進めるとともに、教育においては SST 太陽宇宙環境物理学研究室と密接に関わりながら大学院工学研究科の学生の指導を担当しています。



### 人工衛星データ解析によるジオスペース環境及び太陽大気の研究

惑星間空間は、太陽から吹き出す希薄な超音速プラズマ流（太陽風）によって満たされています。一方、地球などの惑星は固有の磁場を持っていますが、その固有磁場と太陽風が相互作用を行う結果、磁気圏と呼ばれる構造が形成されます。この地球周辺の宇宙空間のことをジオスペースとよびます。磁気圏は太陽風から質量やエネルギーを取り込み、それを蓄積して解放する変化を繰り返し行っています。宇宙嵐やサブストームと呼ばれるその爆発現象と関連して、高緯度域において大規模な自然放電現象であるオーロラが活発化し、また放射線帯（ヴァン・アレン帯）と呼ばれる1,000,000eV を超えるエネルギーを持つ粒子が変動します。それらの変動は、プラズマの運動によって引き起こされます。


私たちは、これらの現象の性質と発生の原因を人工衛星で取得された大量のデータの情報学的な解析とスーパーコンピュータを用いた計算機シミュレーションによって研究しています。ジオスペースは多くの人工衛星が運用されるなど、私たち人類の活動領域となっていますが、太陽表面の爆発現象（フレア）や宇宙嵐にともなう宇宙環境の変動とともに人工衛星の障害などが発生することがあり、私たちの生活にも影響を与える可能性があります。このような人間活動に影響を与える宇宙環境現象：宇宙天気の予報を目指し研究を進めています。

私たちのグループでは、ジオスペースで起こる様々な現象のうち、オーロラや放射線帯の高エネルギー粒子の変動過程についての研究も精力的に進めています。太陽風の変動に伴って、放射線帯の高エネルギー粒子がいつ、どのくらい増えるのかを予測することが可能になれば、人工衛星等の被害を軽減できる可能性があります。2016年に打ち上げられた JAXA の科学衛星「あらせ」の最新のデータを用いて、この高エネルギー粒子の変動過程の研究を行っています。また、観測データとコンピュータシミュレーションを組み合わせた研究も推進しています。

また、ジオスペース環境変動の主な原因である太陽大気の活動についても、JAXA の科学衛星「ひので」、NASA の科学衛星「SDO」や地上望遠鏡で取得された画像を解析し研究しています。なかでも地球環境に最も影響を及ぼすフレアやコロナ質量放出（CME）が、いつどこでどのようにして起こるかに着目し、将来的にフレアの予報を目指し研究を行っています。

ジオスペース探査あらせ衛星（2016年打ち上げ）  
©ERG サイエンスチーム

あらせ衛星が観測したプラズマの波（上）と、電子の分布（下）。上の段のホイッスラー波動が発生すると、電子の分布が下左から下右へと変化し、電子が加速していることが発見されました。（Kurita, Miyoishi et al., 2018 を改訂）




### 画像解析 / データ同化 / 機械学習にもとづく太陽やオーロラ現象の研究

私たちは、太陽およびジオスペースの研究に、最先端の情報学的手法を積極的に活用しています。具体的には、高度な画像解析処理技術、機械学習を用いた大規模データの処理、またデータ同化にもとづく観測とコンピュータシミュレーションの融合研究です。

太陽およびオーロラの研究には、画像データとして取得された観測データを用います。太陽の研究では、「ひので」衛星をはじめとした太陽観測衛星が取得した高解像度の画像データに対して、黒点やコロナホールと呼ばれる領域を自動で抽出・追跡するアルゴリズムの研究を進め、太陽面上の様々なダイナミクスの研究を行っています。また、オーロラの研究では、北欧や北米にオーロラの高速撮像システムを設置し、そこから得られる高時間高空間分解能のオーロラ観測画像の解析を行っています。異なる波長で取得されたデータから、オーロラを引き起こしている電子のエネルギーを推定する手法を開発するなど、観測された元データを様々な解析し、多くの情報を引き出す研究を行っています。



また、データ同化とよばれる観測データとコンピュータシミュレーションを融合させる手法の開発にも取り組んでいます。データ同化は、コンピュータシミュレーションに観測データを取り入れ、シミュレーションで用いている未知変数を実際の観測データをうまく説明できるように最適化することにより、より高精度な計算を実現するものです。私たちは、最先端のデータ同化手法を用いて放射線帯やオーロラ活動指数の変動予測の研究を進めています。さらにニューラルネットワークをはじめとする機械学習の手法を適用する研究も積極的に進めおり、太陽およびジオスペースの現象のパターン認識や自動抽出等の研究を進めています。現代の観測データから太陽の黒点と磁場の関係を機械学習したプログラムにより、200年前（1800年代）に作成された手書きの黒点スケッチから、観測データが存在しない当時の太陽表面の磁場を再現する試みも行っています。

北欧、北米に設置した 100Hz 高速撮像カメラによるオーロラ観測  
© 国立極地研究所、PsA プロジェクト左：オーストリアの図書館に収蔵されている200年前の手書きの黒点スケッチ  
上：機械学習を用いて手書きの黒点スケッチから再現した200年前の太陽表面磁場太陽観測衛星「ひので」  
(2006年打ち上げ)  
© 国立天文台/JAXA

### スーパーコンピュータを用いたジオスペース環境及び太陽大気の計算機シミュレーション

衛星・地上観測データの解析と並んで、コンピュータシミュレーションによる宇宙天気研究が盛んに行われています。宇宙天気予測の実用に耐えるような信頼性の高いシミュレーション手法の構築は重要な課題です。私たちのグループでは、太陽フレアや太陽風・磁気圏相互作用などの巨視的現象を扱う電磁流体力学（MHD）コードおよび、プラズマを構成する電子やイオンなど粒子1つ1つの運動と電磁場との相互作用に起因する微視的現象を扱う運動論コードなどを用いて、スーパーコンピュータを利用した計算機シミュレーションを行っています。


計算機シミュレーションは名古屋大学情報基盤センターのスーパーコンピュータや研究所のスーパーコンピュータを用いて行っています。コンピュータシミュレーションにより、宇宙嵐や太陽フレアがいつどこでどのように起こるかを理解する事を試みています。また、境界層の変動や衝撃波などの宇宙プラズマ環境における素過程もコンピュータシミュレーションを用いて精力的に研究しています。さらに私たちのグループでは、ハイパフォーマンスコンピューティング（HPC）技術を取り入れた超並列シミュレーションコードの開発にも力を入れており、また流体や運動論の方程式系をより高精度・高速に解くための計算アルゴリズムの研究にも取り組んでいます。

上段左：地球磁気圏の3次元 MHD シミュレーション  
上段右：ケルヴィン・ヘルムホルツ不安定性の2次元 Vlasov シミュレーション  
中段左：無衝突衝撃波の2.5次元 PIC シミュレーション  
下段左：磁気リコネクションの2.5次元 Vlasov シミュレーション  
下段右：レイリー・テイラーブー不安定性の2次元 Vlasov シミュレーション「ひので」衛星が観測した太陽黒点およびフレア  
© 国立天文台/JAXA


写真の説明：左より (1) 研究室の教員と学生及びスタッフ、(2) 研究室の日常風景、(3) 国際学会での発表の様子、(4) ISEE のスーパーコンピュータシステム、(5) 北欧でのオーロラ観測、(6) セミナーの様子

Webページ：<https://is.isee.nagoya-u.ac.jp/miyoshilab/>  
連絡先：[miyoshi\\_kyouin@isee.nagoya-u.ac.jp](mailto:miyoshi_kyouin@isee.nagoya-u.ac.jp)（三好研教員）  
TEL:052-747-6916（秘書室）





坪木 和久 教授



篠田 太郎 准教授

## 台風、集中豪雨、豪雪、竜巻などの降水を伴う現象をマルチパラメータ（MP）レーダや雲解像数値モデル（CReSS）を用いて研究しています。

気象条件によって現れては消える雲は、私たちの目を楽しませてくれるとともに、恵みの雨をもたらしてくれることもあります。一方で、場合によっては激しい雨や突風によって、私たちの生活や生命の危機をもたらすこともあります。雲や雨などの現象は、大気中における流体力学や熱力学により支配されています。私たちの研究室では、物理学を基本として雲や雨という現象を理解することを目指しています。

そのために、主に降水現象を理解するための気象レーダ（マルチパラメータレーダ、偏波ドップラーレーダとも呼ばれます）と雲解像数値モデルを道具として研究を行っています。レーダや数値モデルを用いて雲の中の風（気流）や温度、水蒸気の量などの空間分布や時間変化を調べることで、雲の中の力学場や熱力学場（雲力学過程：cloud dynamics）と、雲・降水粒子の形状や大きさ、粒子数の時空間変化（雲物理学過程：cloud microphysics）の理解を目指します。

研究を行うためには物理学と物理数学の基礎と計算機を使いこなす能力が必要となります。そして、何よりも雲や雨という現象に対する興味（好奇心）があり、自分の頭で物事を考えられる学生さんの来訪を心待ちにしています。雲や雨に興味のある方は、是非とも研究室に来てください。

### 台風の内部構造や発達過程に関する研究

一つ一つの積乱雲の内部構造から台風全体の構造を表現できる高解像度の雲解像モデル CReSS を用いて、台風の内部の風や温度の場、雲・降水粒子の分布を再現し、急激に台風が発達する原因や発達が抑えられる理由の考察を行っています。

また、台風は海上で海面からの顕熱・潜熱フラックスを得ることで発達しますが、台風も海洋に影響を与えます（台風海洋相互作用）。雲解像モデル CReSS に海洋学研究室の相木准教授が開発した 3 次元海洋モデル NHOES を結合した CReSS-NHOES を用いて、台風海洋相互作用が台風の強度や進路に与える影響についての研究も行っています。

CReSS や CReSS-NHOES を用いて、社会的に影響が大きな台風や過去に大きな災害をもたらした台風（伊勢湾台風など）の再現実験も行っています。そして、将来気候（地球温暖化が進行していると想定される条件下）における台風の強度についても想定実験を行っています。想定実験で計算される強風や大雨の顕著な値は、大学間連携プロジェクトにおいて、被害軽減策の立案に役立てられています。




将来気候時に日本に接近する台風のシミュレーション結果例

### 豪雨・豪雪・竜巻・突風などの激しい気象現象に関する研究

豪雨・豪雪・竜巻・突風などの激しい気象現象は、積乱雲を含む降水システムによってもたらされます。

降水システムの内部構造（風や降水粒子の 3 次元分布）を観測するために、2 台の X バンドマルチパラメータレーダを運用しています。これまでに、名古屋市周辺（雷雲や雪雲、降水システムの観測）だけでなく、沖縄県（梅雨前線帯の降水システムの観測）、石川県や北海道（冬季の降雪雲の観測）、パラオ共和国（台風の発生に影響する熱帯域の降水システムの観測）などでレーダ観測を実施しています。マルチパラメータレーダにより取得されるパラメータを組み合わせて、降水システム内部の雨・雪・霰などの様々な種類の降水粒子の 3 次元分布を推定する手法も、当研究室で開発・改良を行っています。降水粒子の分布とドップラーレーダより取得される 3 次元風速場を用いて、降水システム内部の雲力学過程と雲物理学過程を組み合わせた解析を行っています。

また、雲解像モデル CReSS を用いてレーダでは観測できない水蒸気場や温度場、降水システム周辺の風の場を解析し、積乱雲の発達過程や降水システムの持続過程、竜巣の渦の生成過程などについても解析を行っています。



中部電力三国山レーダにより取得された東海豪雨発生時（2000年9月11日17時54分）のレーダ反射強度の3次元分布。水色→黄色→橙色と変化するほど強い雨が存在することを示す。地上の赤い点は東海市の位置を示す。


### エアロゾル-雲-降水相互作用の理解

エアロゾル-雲-降水相互作用の理解は降水システムにおける雲微物理過程の理解だけでなく、地球全体の気候システムにおける雲の役割を理解する上でも重要です。


当研究室では、顕微鏡カメラを搭載した雲粒子ゾンデ（HYVIS）を気球に取り付けて放球し、上空の雲粒子の直接観測を行うことで、雲粒子の特徴（形、大きさ、数）の鉛直分布を観測しています。これまでに、マルチパラメータレーダ観測と同期して、沖縄県、北海道、パラオ共和国などで観測を実施しています。実際の粒子の特徴を観測することで、レーダ観測の結果や数値モデル CReSS の雲微物理過程の妥当性を評価することを目的としています。

また、最近導入された Ka バンド雲レーダは、降水粒子よりも小さな雲粒子の 3 次元分布を観測することができます。HYVIS や Ka バンド雲レーダを用いて、雲の 3 次元分布や雲内の粒子の分布の推定を行っています。

今後は、雲の発生につながる大気中の塵（エアロゾル）の分布や塵が雲の核となって雲粒に成長する過程の理解も目指していきます。エアロゾルによる雲粒の生成が起こる場所と生成される雲粒の大きさを理解することは、大雨の発生過程や台風の進路と強度の予測に大きな影響を及ぼすことが最近の研究で示唆されています。今後、CReSS にエアロゾル過程の導入やエアロゾルの発生源である陸面過程の精緻化を行っていくことで、エアロゾルから雲粒の生成過程、そして降水によるエアロゾルの除去過程などを調べていきます。また、エアロゾル-雲-降水相互作用の理解には、航空機を用いた観測も積極的に利用していきます。



（上）2013年6月15日にパラオ共和国で放球された雲粒子ゾンデ HYVIS により取得された雲粒子と固体降水粒子の画像  
（右）名古屋大学に設置されている Ka バンド雲レーダ



### 雷の理解

雷は積乱雲の中で氷粒子（霰粒子と氷晶粒子）同士の衝突により電荷が生成され、雲内のある領域に蓄積された電荷が中和されることで発生します。雷を理解するためには、氷粒子の分布の再現、氷粒子同士の衝突による電荷分離過程の再現、そして電荷中和過程（発雷過程・放電過程）の再現が必要となります。当研究室では、雲解像モデル CReSS に電荷分離過程と電荷中和過程を組み込むことで、雷モデルの開発を行うとともに、電荷の蓄積過程と発雷過程の理解を進めています。

2010 年 7 月 15 日に岐阜県可児市周辺での大雨発生時の種類別の降水粒子と雷の放電経路の 3 次元分布。白は雲氷、青は雨、水色は雲氷、黄色が雪、桃色が霰の分布を示す。赤、青、黄色の太実線が雷の放電路を示す。




写真の説明：左より (1) 研究室メンバー、(2) パラオ共和国でのレーダー観測、(3) 台風観測に使用する航空機、(4) 沖縄での雲粒子を対象とした気球観測の様子、(5) 沖縄での集中観測時の様子（雨が降っていない場合）、(6) 雲レーダーを用いた雲観測

Webページ：<http://www.rain.hyarc.nagoya-u.ac.jp/>  
連絡先：tsuboki@nagoya-u.jp (坪木)  
shinoda@rain.iise.nagoya-u.ac.jp (篠田)





高橋 暢宏 教授



増永 浩彦 准教授

## 地球観測衛星や地上設置機器などさまざまな観測装置を駆使して、地球水循環の要の一つである雲や降水が織りなす気候や気象の成り立ちを探る。

降水は生命にあまねく恵みの水をもたらすと同時に、大規模な水害の引き金になることもあります。しかし熱帯地方で頻発する雨は、太陽から受け取った熱を中・高緯度へ輸送する大気循環を力学的に維持する上で、欠かせない役割を果たします。さらに雲は、地球が太陽から受け取る放射エネルギーを直接左右する一方、熱赤外放射の再分配を通じて大気温室効果の促進にも一役買っています。雲と降水は私たちの生活に密接に関わることはもちろん、地球規模の気候変動においても積極的な役割を果たしています。

雲降水科学研究室では、雲や降水が地球の気候場と関わりあう物理的メカニズムをより深く理解するとともに、最新のリモートセンサ（衛星搭載・地上設置を問わず気象レーダや赤外イメージヤなど）を用いて地球規模から生活規模までの雲や降水（雨・雪）現象を把握することを目指しています。

### 新たな衛星データ解析手法にもとづく熱帯の雲対流と大気環境場の変動解明

熱帯の雲は、環境場の条件が整えば、スコール・ラインのような激しく力強い降水システムに発達することがあります。激しい対流発達を促したり抑止したりという条件を決めるのは、水蒸気や静的安定度といった熱力学的要因や鉛直風シアから冷気の侵入などの力学的要因に至るまで多様です。しかし、対流雲は外的強制力に受動的に応答するだけではなく、周囲の湿度・気温・風系場に影響を与え最終的には大規模環境場の状態を変えてしまうこともあります。そのような熱帯対流と環境場の相互作用は、熱帯気象・気候システムの要の一つであります。そのため、その実態を読み解くことは大変難しく、いまでも充分な理解に至っていません。

衛星観測は、雲形成過程に伴う大気の迅速な（数時間ほどの）変化を調べる上では、必ずしも最適な手段とは言えません。低軌道衛星が地球上の同一地点の上空を通過する頻度は、せいぜい一日2回に過ぎないからです。現在取り組んでいる研究の特筆すべき点は、もっぱら低軌道衛星の観測データのみを駆使して、数時間から一日以内の変動を描くことに成功した点です。衛星観測による雲の発達と大気環境場の短期変動の研究に、新たな道を開拓つつあります。




図1. 対流発達に伴う水蒸気変動（上）と雲量変動（下）

### 最新のリモートセンシング技術を用いた雲・降水物理量の推定とその応用

地球温暖化問題に象徴される気候変動において注目されていることの1つに雲や降水の役割とその変動が挙げられています。雲やエアロゾルは気候温暖化における放射強制力の寄与の不確定性が最も大きいものであり、また、降水は温暖化の結果として降水パターンの変化や豪雨・スーパー台風の増加などが懸念されています。本研究室はこのような問題に取り組むために最新のリモートセンシング技術を用いた雲や降水物理量を推定する手法の研究を行っています。特に、人工衛星搭載の雲レーダや降水レーダーを用いた研究や地上設置の最新型のレーダーを用いることにより、これまで観測が不可能であった現象をとらえることが可能となります。また、これらの情報を最大限に活用することも視野に入れた研究を行っています。

図2は熱帯降雨観測衛星（TRMM）の降雨レーダーとCloudSatの雲レーダーから推定した代表的な雨粒のサイズの地球上（海のみ）での分布をプロットしたものであり、このような知見は特に海上では得られず、データの蓄積が重要となっています。




図2. 海上の降水の特徴（降水量、代表雨滴直径）（2006年12月から2007年11月の季節ごとの値）

### 地球観測を支えるリモートセンシング技術開発

気象学では理論（数値モデル）と観測の2つが大きな研究の柱となっており、観測に関しては技術の進歩が研究を支えているという側面があります。特にリモートセンシング技術は広範囲を短時間で観測できるメリットがあり、これまでひまわりや気象レーダといった分野で大きな発展を遂げてきました。現在でも衛星観測では高性能なレーダを搭載した衛星や光学センサなどが開発されてきており、様々な分野で貢献しているほか、地上観測でも下の図に示すようなレーダ技術はマルチパラメータレーダからフェーズドアレイレーダ、さらに偏波機能を備えたマルチパラメータフェーズドアレイレーダといった、新しい技術を活かした降水観測技術に移行しつつあります（図3）。それらを有効に活用する研究も必要となっています。衛星搭載のレーダについても、技術成熟に伴って高度化・高機能化へと進んでいます（図4）。本研究室においても、主に最新のレーダーのデータを用いた研究を行うとともに、将来の観測に向けてレーダーの性能向上に対する観測データの品質向上などに関する基礎研究を行い、衛星搭載や地上レーダーの開発に結びつける研究を行っています。



図3. 地上レーダーの将来動向




図4. 衛星搭載降水レーダーの将来動向

### 衛星データシミュレータ SDSU の開発と数値モデル検証研究

衛星計測データを計算機上に再現する放射伝達シミュレーションは、リトリーバル・アルゴリズムに欠かせないコンポーネントの一つです。放射伝達シミュレーションは、放射の吸収や散乱といった様々な物理過程を解きほぐしながら、放射と地球表面・大気構成物質が相互作用するようを計算機上に再現します。放射伝達問題を解く計算手法は、実用上の理由からセンサ特性ごとそれそれに異なる最適化が施されています。たとえば、マイクロ波帯用に設計された放射伝達コードは、一般的には可視・赤外シミュレーション・プログラムと互換性はありません。しかし近年では、複数のセンサを搭載した地球観測衛星の登場により、さまざまなタイプのセンサに一様に適用できる放射伝達コードへの需要が高まりつつあります。衛星データ・シミュレータ・ユニット（Satellite Data Simulator Unit, SDSU）は、衛星搭載マイクロ波放射計、レーダ、可視赤外イメージヤから得られたデータをシミュレートする目的のもと開発されました。SDSU パッケージの応用例としては、リトリーバル・アルゴリズム開発はもとより、雲解像モデル（CRM）への適用も重要な課題の一つです。種々の衛星センサを想定したシミュレーション結果を実際の観測と比較し解析することにより、CRM 性能のテストや改良の一助となることが期待されます。






図5. SDSU で計算された疑似衛星観測データ



(1)



(2)



(3)



(4)



(5)



(6)


写真の説明：左より (1) 研究室メンバー、(2) 研究室セミナーの様子、(3) MP レーダーの見学会、(4) パラオ共和国での集中観測の合間の一コマ、(5) ダジックアースを使った授業の様子、(6) 大学院生とのディスカッションの様子

Webページ：<https://cldprc.isee.nagoya-u.ac.jp/>  
連絡先：ntaka@nagoya-u.jp (高橋)  
masunaga@nagoya-u.jp (増永)





持田 陸宏 教授



大畠 祥 助教

## 雲凝結核としての働きなどを通して雲・降水過程や放射収支に関わる大気エアロゾルに着目し、化学を基盤とする野外観測・室内実験研究によって、その性状や動態、役割の解明を目指します。

大気中には、自然や人間活動を起源に持つ様々な微粒子（エアロゾル）が浮遊しています。そして、このエアロゾルは雲粒が生成する際の核（雲凝結核）としての働きなどを通して、雲・降水過程や放射収支に関与しています。気象や気候を支配するメカニズムを解明する上で、エアロゾルの性状や動態、そしてそれに起因する役割を理解することは重要な課題となっています。


大気化学研究室では、エアロゾル質量分析などの先端的な計測技術を活用した野外観測と室内実験により、その性状や動態、役割の解明を目指しています。これらの研究では特に、大気輸送の視点を取り入れながら、エアロゾルの性状と化学組成の関係や、大気反応に伴う生成・変質を明らかにすることを重視しています。私たちは、このような「物質科学」の視点を取り入れた研究の取り組みを通して、大気エアロゾルの気象・気候に対する影響の理解への貢献を図ります。大気エアロゾルは高濃度で存在することで人間の健康に悪影響を及ぼす汚染物質であり、私たちの大気エアロゾル研究の取り組みは、大気質の理解にも貢献することが期待されます。



### 有機エアロゾルの化学構造と特性の研究

大気エアロゾルの 20% ~ 90% は有機物が占めており、この有機物は、数千種類以上の化合物から構成されると考えられます。この有機エアロゾルの気象・気候への関わりを理解するためには、気象・気候への作用に関係する有機物の吸湿性や光学特性、また、それらを規定する化学構造の理解が必要となります。しかし、有機物は多様な起源を持ち、起源によって化学組成が異なる上、大気中で変質が進むことが指摘されており、有機エアロゾルがどのような環境においてどのような成分で構成されているのか、その全体像はいまだ明確になっていません。また、エアロゾルの吸湿性・光学特性が、有機物の化学構造とどのように関係しているのかも十分に解明されていません。

私たちは、大気中の有機エアロゾルを採取した上で分画し、その化学構造・吸湿性・光学特性を解析する研究を発展させることで、有機エアロゾルの化学構造と特性をより深く理解し、エアロゾルの特性、ひいてはその役割に対する有機物の寄与を解明することを目指します。このため、質量分析法や赤外分光法の手法を用いて有機エアロゾルの化学構造に関する情報を取得した上、その吸湿性・光学特性を測定して化学構造と特性の関係の解析を進めます。



大気有機エアロゾルの起源・変質と気象・気候への影響



### 大気エアロゾルの吸湿特性と雲凝結核活性の研究

大気中においてエアロゾルは、周りの水蒸気を取り込んで大きくなり、また放出して小さくなることを繰り返し、時には雲粒に変化します。エアロゾル粒子を構成する化学成分が水を取り込む能力（吸湿特性）は、粒子が雲粒化する能力（雲凝結核活性）を規定している因子の一つであり、この吸湿特性と雲凝結核活性は、エアロゾルの雲・降水過程への関与を理解する上で鍵となる特性です。ところが、大気エアロゾルを構成する物質の組成は環境によって異なり、エアロゾルがどこでどのような吸湿特性、そして雲凝結核活性を有するのかを説明することは容易ではありません。

私たちは、吸湿特性測定用タンデム DMA (HTDMA) や雲凝結核カウンタ (CCNC) と呼ばれる先端計測装置を用いて、大気エアロゾルが空気中の水分を取り込んで成長する程度を詳細に調べています。そして、これらの装置で得られるデータと、エアロゾルの化学組成の分析を組み合わせることにより、粒子中の化学成分が、水の取り込み／蒸発などの熱力学的な平衡条件に、どのような寄与があるのかを評価します。極めて複雑な組成を持つ有機物がエアロゾルの吸湿特性・雲凝結核活性に及ぼす影響についての理解は特に不足しており、有機物の化学構造と吸湿特性の関係など、有機物の寄与を定量的に把握するための研究に力を注いでいます。




エアロゾル粒子の吸湿成長度と雲凝結核活性を測定するための装置群 (HTDMA, CCNC 等)

### 混合状態を考慮した大気エアロゾルの組成・特性の研究

現在、雲凝結核としての雲・降水過程への関与など、個々の粒子の違いが重要となる「個数」ベースのエアロゾルの分布・輸送・変質・特性に関する理解が立ち遅れています。これは、大気エアロゾルに関わるこれまでの観測・モデル研究の多くが、エアロゾル粒子の重量濃度をベースに平均化された情報を扱ってきたことと関係しています。今後の大気エアロゾル研究では、個々の粒子の性状を明らかにし、それらの混合状態の情報を見集め、大気中の役割の理解に結び付けるか、それを示す方法を見出すことが重要になると考えています。

個々のエアロゾル粒子を区分する指標として、歴史的には「粒径」が最も一般的に扱われてきました。しかし、同サイズの粒子でも、発生源・生成過程の違いにより、様々な組成・特性を持つものが大気中に混在しています。私たちは、吸湿特性測定用タンデム DMA (HTDMA) を用いることで、粒径以外に吸湿成長度（加湿に伴う粒径の変化率）を基準に粒子を選別することが、異なる組成・特性を持つ粒子の混合状態を理解する上で有効であると考え、大気エアロゾルの化学組成や特性を、エアロゾルの混合状態（粒径 + 吸湿特性）とともに解析する研究を始めています。この取り組みにより、大気エアロゾルの特性や過程を、混合状態の視点も含めて把握する新しい研究の展開を図ります。




吸湿特性測定用タンデム DMA と他のエアロゾル計測器を組み合わせる、大気エアロゾルの混合状態の解析手法

### 光吸収性エアロゾルの動態と特性に関する研究

化石燃料やバイオマスの燃焼で発生するブラックカーボン (BC) は、太陽放射を強く吸収し、大気を暖める効果を持っています。また近年、人為起源の酸化鉄粒子による大気加熱効果の重要性も指摘されています。しかし、これらの光吸収性エアロゾルの気候影響の推定には未だに大きな不確実性があり、光吸収性エアロゾルの空間分布や特性を支配する「発生・輸送・変質・除去」の各過程を、正確な測定に基づいて定量的に理解することが求められています。

私たちは、人間活動の活発な都市域や、大気汚染物質の長距離輸送を捉える遠隔地、急速に温暖化の進行している北極域など、様々なフィールドで光吸収性エアロゾルの集中観測と長期モニタリングを実施しています。特に、レーザー誘起白熱法に基づく測定器 (SP2) を用いた個別粒子分析により、BC・酸化鉄の光学特性や雲凝結核能に大きな影響を及ぼす物理量（粒径・混合状態）の定量が可能です。SP2 と他の測定器を組み合わせた観測により、光吸収性エアロゾルの動態や、濃度・被覆を変化させる大気化学・輸送除去過程の理解の深化を目指します。




エアロゾル粒子をオゾンに曝露する反応実験のための装置

写真の説明：左より (1) 研究室の集合写真、(2)~(4) 京都大学和歌山研究林における大気観測、(5) 観測作業の合間に、(6) 学術研究船白鳳丸に設置したエアロゾル測定機器

Webページ：<http://acg.isee.nagoya-u.ac.jp/>  
連絡先：mochida@isee.nagoya-u.ac.jp (持田)





栗田 直幸  
准教授

田代 悠人  
研究員

檜山 哲哉  
教授

藤波 初木  
講師

金森 大成  
研究員

近藤 雅征  
特任助教


## 地球温暖化に代表される気候変動と陸域の水・物質循環の変化との関係を、熱帯域から極域までをフィールドに、観測、実験、モデル、データ解析から明らかにします

太陽放射をエネルギー源として駆動する地球表層の水循環は、地球の低緯度域と高緯度域の水・エネルギーの循環を通して、グローバルな気候の形成と変動に重要な役割を果たしています。そして、人間活動による温室効果ガスの放出や土地利用の変化は、我々が暮らす陸域を超えてグローバルな水循環に影響を及ぼし、地球規模の深刻な被害をもたらすと予想されています。


水文気候学研究室では、熱帯域から極域にいたる複数の観測サイトで降水、大気中の水蒸気量、蒸発散、土壤水分、温室効果ガスの観測を行い、人間活動が水循環・物質循環に及ぼす影響を評価するとともに、地球温暖化による気候変化が地球表層の水循環・物質循環にどのような影響を及ぼすのか明らかにする研究に取り組んでいます。特に、気候変動が植生や地表面状態をどのように変化させ、その結果、水循環や物質循環がどのように応答するのか解明しようとしています。水文気候学研究室は、環境学研究科地球環境科学専攻 地球水循環科学講座の一部を担い、大学院教育に参画しています。地域スケールから地球規模までのマルチスケールな水・物質循環に興味のある方、北極・寒冷圏、アジア各地、アフリカ、南極大陸といった世界各地のフィールドで行っている観測に参加したい方を募集しています。皆さんの訪問をお待ちしています。

### 極域から熱帯域までの水・物質循環を様々なツールを用いて解明する

水は地表面から蒸発して雨や雪として地表面に戻るという循環を繰り返していることはご存じだと思います。では、雨をもたらす水蒸気はどこからどのような経路で輸送されてきたのでしょうか？また、地球温暖化によって気候が変化した時、我々が暮らす地域に降る雨はどのようにかわるのでしょうか？意外かもしれません、こういった身近な疑問に正確に答えることはまだできません。水文気候学研究室は、こういった身近な疑問に答えを出し、そして水循環が気候システムの維持・形成に果たす役割を解明するために必要となる研究課題を取り組んでいます。研究対象は地域スケールから地球規模スケールで起こる水循環と非常に幅広く、日本だけでなく海外でも野外観測を行っています。また、マルチスケールでおこる水循環過程の解明を行うために、フィールド観測、ラボ実験、データ解析、数値モデルなどの手法を組み合わせて研究を行っています。研究室では、個人の適性にあわせて研究地域、研究手法を選択することができますので、みなさんの興味にあう研究テーマを見つけてください。



地球水循環の概念図



水文気候学研究室で扱う研究対象（研究手法）



### 永久凍土調査・湧水調査（北極・寒冷圏）




地球温暖化によって、東シベリアとモンゴルでは永久凍土表層の融解が進んでいます。現地の湧水を採取し、湧水中のトリチウム濃度やフロン類の濃度を分析することで、凍土に含まれる地下氷がどのくらい融解しているかを調べています。




東シベリア、モンゴル、ナミビア北部で水文気象観測を行い、蒸発散量や二酸化炭素交換量の季節変動・年々変動を推定して気候変動や人間活動との関係を調べています。それらをもとに、気候変動に対する適応策に結びつけることを目標としています。

### 大陸スケール水循環の解明（数値モデリング）



ユーラシア大陸の内陸部は海洋から数千キロメートルも離れていますが、夏には降水が高頻度で観測されます。この水はどこからどのような経路で輸送されてきたのでしょうか？世界の降水分布を再現できる数値モデルを使ってこの謎の解明に取り組んでいます。

### アジア域における降水活動（データ解析）



アジアモンスーンによる豊富な降水は、世界人口の約6割の生活を維持しています。その雲・降水は様々な時間・空間スケールの変動を伴います。データ解析を通して、雲・降水活動の実態とその変動機構の解明を行い、地球の気候システムの理解を目指しています。



### 温暖化・人間活動影響の検出（南極大陸）

東南極地域は、記録的な豪雪が頻繁に発生するなど、温暖化の影響と疑われる現象が観測され始めました。豪雪をもたらすメカニズムを解明するとともに、その発生頻度が温暖化の進行とともにどのように変化するかを調べています。




### 気候変動と植生（北極・寒冷圏、海洋大陸域）

タイガ林や熱帯雨林といった植生は、気候変動や人間活動によって急激に変化しています。水循環を中心とした気候変動と植生との関わりを現地観測やデータ解析から明らかにし、気候変動が植生に及ぼす影響や、植生の変化が水循環に及ぼす影響を調べています。

### データ解析

- ・アジア域における降水活動
- ・海洋大陸における水循環過程
- ・乾燥域の大気陸面相互作用
- ・熱帯擾乱の発生環境



### 数値モデルリング

- ・極端現象のメカニズム解明
- ・大陸スケール水循環の解明
- ・古気候における水循環復元
- ・気候変化に伴う植生変化予測



研究フィールドと現在行っている多彩な研究課題

### フィールド観測

- ・永久凍土調査・湧水調査
- ・水文気象観測
- ・観測船による洋上気象観測
- ・温暖化・人間活動影響の検出


### ラボ実験

- ・水トレーサー物質の分析
- ・温室効果ガスの分析
- ・分析手法の高度化
- ・自動計測装置の開発

写真の説明：左より、(1) 研究室が主催した共同研究集会、(2) モンゴルでのドローン観測、(3) 気象解析を行うチベット高原の風景、(4) 南極内陸旅行で利用する雪上車、(5) 研究室セミナーの様子

Webページ：<https://hydroclimatologylab.home.blog/>  
連絡先：[hiyama@nagoya-u.jp](mailto:hiyama@nagoya-u.jp) (檜山)





石坂 丞二 教授

相木 秀則 准教授

三野 義尚 助教


## 海洋観測・衛星リモートセンシング・数値シミュレーションにより、海洋の物理・化学・生物過程の自然の変動と、人為的な変化を明らかにする。

地球の表層の約7割は海洋に覆われておらず、表層に存在する水の97%が海水からなっています。そのため、海洋は地球上のエネルギーの流れや物質の循環を大きく左右しており、気候や気象にも強く影響しています。また、そこには多くの生物があり、人間の食料となるばかりではなく、二酸化炭素のような物質の循環にも影響をしています。これだけ広い海洋ですが、人間生活の影響を着実に受けている他、特に陸域から淡水など供給のある沿岸域では赤潮が起こるなど生態系が直接的な影響を受けている他、人間の引き起こす気候の変化とも密接に関連し合っています。

私たち海洋学研究室では、最新の人工衛星による観測や数値シミュレーションによる研究を、海洋の現場観測も行なっており、海洋の熱収支や流れ・波浪が大気環境とどのように相互作用し、気候や台風などの気象現象とどのように関連し合っているのか、これによって起こる海洋の流れや混合過程が海洋の一次生産者である植物プランクトンを基盤とした海洋生態系にどのように影響を与えていくのか。逆に生態系が物理現象や気候へ影響する可能性はないのか。互いに関連し合う、海洋の物理・生物・化学過程、さらに気候や気象現象まで含めて研究しています。

### リモートセンシングによる地球上の海色に関する研究

宇宙から地球上の海の色を測定する海色リモートセンシングは、海洋の一次生産者である植物プランクトンやその生息環境に関して、地球規模での観測が可能です。最近では植物プランクトンの全量から、水に溶けた二酸化炭素を有機物に変換する一次生産速度、あるいはどのような種類の植物プランクトンがいるのかまでわかるようになります。これまで空間解像度1kmの衛星が一般的でしたが、2017年末には解像度250mの日本の衛星GCOM-Cが打ち上げられ、沿岸域での詳細な観測が可能となります。また静止衛星を利用することによって、一日以内の短い時間スケールでの現象の観測が可能になってきています。一方で、大気中のエアロゾルの存在は、海洋を観測する上では誤差要因となります。同時にエアロゾルからの物質供給が植物プランクトンの増殖に重要であることも指摘されています。海洋学研究室では、このような海色リモートセンシングに関する、技術的な研究からその応用研究までを行っています。



海洋の一次生産分布

海洋では微生物である植物プランクトンが光合成を行って有機物を作り出しています。一次生産速度はこの光合成による有機物の作られる速度で、この図で緑の海域は有機物が作られる速度が早い海域で魚類等の生産も高くなっています。一方、青の海域は生産速度の遅い海域で、海の砂漠と呼ばれています。この速度は、温暖化で問題となっている大気中の二酸化炭素濃度にも影響を与えます。



(1)




(2)



(3)



(4)



(5)




(6)

### 日本周辺海域の海洋生態系における気候変動や人間活動の影響に関する研究

日本周辺海域は古くから多くの魚が漁獲される生産の高い海で、現在でも多くの水産物が水揚げされています。日本の多くの内湾では、1970年代から人口の増加や近傍の工業化などに伴って赤潮や貧酸素化などの環境問題が起きており、最近では栄養塩の総量規制など環境を良くするための政策もとられていますが、環境が本当によくなっているのかの評価は分かれます。一方、東シナ海や日本海など日本周辺の縁辺海では、近隣諸国の発展に伴って、環境の状況が変化していると考えられます。またこれらの海域では、地球規模の気候の変動や変化の影響も受けていると考えられます。


海洋学研究室では、他大学・研究機関との共同研究で、長年にわたってこれらの海域において光学や生物学的な観測を行っています。現場での観測データと人工衛星データを解析することによって、これらの海域の植物プランクトン量や群集構造の変動・変化とその環境要因との関係を明らかにしています。また、台風など極端気象がどう海洋生態系に影響を与えているかの研究も行っています。



衛星海色による伊勢湾プランクトンの分布

### 高速フラッシュ励起蛍光法による海洋基礎生産力の実測


近年、衛星リモートセンシングによって海洋の基礎生産力の広域分布が推定されるようになりましたが、その実利用のためには実測値で検証することが不可欠です。しかしながら、船舶観測における培養法を用いた実測は時間・労力コストが大きいため、時空的に検証データが不足しているのが現状です。そこで、私たちの研究室では、高速フラッシュ励起蛍光法(FRRF)を用いた基礎生産力の実測手法の確立を目指しています。FRRF法は海水中の植物プランクトンに対して青色光を高速で点滅照射し、得られた蛍光の短時間変動(~1秒間)からプランクトン1細胞当たりの光合成パラメータを算出します。この測定を係留バイオフローリングフロー等を用いた観測と組み合わせることで、連続的に基礎生産力をモニタリングすることが可能になります。また極めて高い時間分解能をもつため、従来の船舶観測では捕捉できなかったような、様々な時間スケールの環境変化に対する植物プランクトンの生理学的応答を明らかにすることが期待されています。



高速フラッシュ励起蛍光光度計(FRRF, 左写真)を搭載した係留観測システムで取得した時系列データ。3-5段目: クロロフィル量、光合成速度、PS II の最大量子率收容

### 海洋圏の環境・災害問題についての数値シミュレーション


この研究の醍醐味は、海洋学・気象学・波動乱流・土木工学・計算幾何学の知識を組み合わせて、環境問題と災害問題に関する自然現象のメカニズムを解明することです。私たちは多圈結合モデルの一部としての海洋圏モデルの開発を継続し、それを用いた数値シミュレーション研究を行っています。特に気象学研究室と協力して台風に代表される突発的な顕著現象に伴う高潮・高波などの海洋災害の予測精度の向上を目指してきました。大気モデルCReSS・海洋モデルNHOES・波浪(海面の風波やうねり)モデルの間の交換物理量は20種類あります。その表現方法の整合性について、私たちは数値計算による検証と理論発展を進めています。大気と海洋だけを結合した数値シミュレーションモデルは最近では珍しくありませんが、これに波浪モデルを加えているのは世界的に見ても最先端の研究の一つです。今後は海洋生態系モデルの導入や衛星観測との比較を充実させ、発展途上国への自然環境・災害問題の監視・予測に貢献します。



海洋圏の数値シミュレーション研究と多圈モデル・連携課題の模式図

### 太平洋・インド洋・大西洋・南大洋における各種波動と気候変動との相互作用の解析

海洋の波動全般の面白さは、海岸線・海面・海底といった境界条件が波の性質を決めることがあります。これによって波の捕捉・反射・回折が生じます。特に赤道域の海洋は「波動現象の宝庫」と呼ばれています。実際、海洋の赤道ケルビン波や赤道オーストロ波は、太平洋のエルニーニョ現象やインド洋ダイポールモード現象のような熱帯の気候変動において、重要な役割を担います。その他にも時空間スケールの小さいものから順に並べると海洋中には、海面波浪(風波)・津波・潮汐波・慣性重力波・ケルビン波・ロスビー波が存在します。また黒潮・メキシコ湾流・南極周回流のような基本流が不安定を起こして渦が形成されます。励起・維持機構がまだわかつていない波動・渦も多数が存在します。人工衛星による海面高度観測データの蓄積や3次元海洋数値シミュレーションの発達によって、これらの波動・渦を詳細に診断することができます。近年可能になってきました。私たちが各種波動によるエネルギー伝達経路を同定することで、新しい物理メカニズムの発見と、気候変動における波動の役割の解明を目指しています。



人工衛星搭載海面高度計によって観測された1997/1998年のエルニーニョ現象(cm)

写真の説明: 左より (1)IHP国際トレーニングコースでの集合写真、(2)高校生向け回転水槽による体験学習の様子、(3)長崎大学の練習船、(4)長崎大学の練習船による東シナ海での海水採取の様子、(5)三重大学の練習船による伊勢湾での観測、(6)JAMSTEC横浜研究所にて

Webページ: <http://co2.hyarc.nagoya-u.ac.jp/>  
連絡先: jishizaka@nagoya-u.jp (石坂)  
aiki@nagoya-u.jp (相木)





南 雅代 教授



加藤 丈典 准教授


## 地球のフィールドスケールから顕微鏡スケールまでの空間情報に時間軸を入れ、地球誕生から現在まで 46 億年にわたり地球で生じた現象とそのメカニズムを解き明かす。

地球年代学とは、さまざまな宇宙・地球物質の年代を決定し、太陽系惑星の一つとしての地球に記録された歴史を紐解いていく学問分野です。46 億年前に生まれた地球は常に変動しており、その情報は地球内外の物質に記録されています。過去から現在にわたり地下深部から宇宙までの広い範囲で起きた現象を理解するためには、「いつ」「どのような現象が」「なぜ」生じたのかを正確に知る必要があります。そのためには、フィールドワークによりマクロスケールの地球の姿を観察し、ミクロスケールに記録された物理情報、化学情報を正確に引き出さなければなりません。

地球年代学研究室では、特に「いつ」の現象なのかという問題を、放射性同位体の壊変を利用した年代測定法や、名古屋大学が世界に先駆けて開発・実用化した CHIME 年代測定法などを用い、隕石、岩石、鉱物、堆積物、生物化石、石筍、地下水、氷、木片、考古遺物など、さまざまなものに時間軸を付与することによって明らかにする研究を行っています。本研究室は、名古屋大学大学院環境学研究科地球環境科学専攻の協力講座である「地球史学講座」を博物館とともに担い、年代学に関する高度な知識と先端的な分析技術を修得した大学院生及び若手研究者の育成を目指しています。地球科学・化学・物理学・生物学・考古学など、理系・文系さまざまな分野出身の学生が一緒に研究を推進しています。興味のある方は、是非とも研究室を訪ねてみてください。

### 放射性同位体を用いた年代測定・環境解析

親核種と娘核種の同位体比の時間的変化を利用する方法（ルビジウム (Rb)-ストロンチウム (Sr) 法、サマリウム (Sm)-ネオジム (Nd) 法、ウラン (U)-トリウム (Th)-鉛 (Pb) 系列法など）、宇宙線生成核種を利用する方法（放射性炭素 ( $^{14}\text{C}$ ) 法、ベリリウム-10 ( $^{10}\text{Be}$ ) 法など）を利用し、岩石、鉱物、化石、堆積物などの年代測定を行っています。年代測定だけでなく、微量同位体をトレーサーとした古環境解析や環境動態解析の研究も行っています。環境史学研究室と密接に関わり合いながら、加速器質量分析装置を使い、時空間変動に着目した宇宙・地球環境の性状と動態に関する研究にも取り組んでいます。 $^{14}\text{C}$  以外の宇宙線生成核種を用いた研究はまだ発展途上ですが、今後、他の宇宙線生成同位体を使った新たな研究を開始していく予定です。皆さんと協力して、超高感度分析による新たな研究分野の創造を目指します。



Sr 同位体比を高精度に測定可能な表面電離型質量分析装置




$^{14}\text{C}$  を高精度に測定可能なタンデトロン加速器質量分析装置



(1)



(2)



(3)




(4)



(5)



(6)



(7)

### 同位体地球化学による地球環境変動の解明

本研究室では過去の地球で起こったさまざまな現象に年代軸を与えるとともに、年代測定を地球環境に応用する研究や、新しい分析方法の開発など、幅広い分野の研究を行っています。本研究室で行っている研究の一部を以下に紹介します。

- ・細粒河川堆積物を用いた日本の広域 Sr 同位体比分布図
- ・河川・湖沼堆積物の  $^{10}\text{Be}$  の吸着・溶脱プロセスに関する研究
- ・石筍やトラバーチンによる古気候解析
- ・炭酸コンクリーション中の Sr 同位体比を用いた地層の形成年代決定
- ・永久凍土中の地下氷の正確な形成年代決定のための基礎研究
- ・火山泥流に含まれる木片の  $^{14}\text{C}$  年代に基づく火山噴火周期解析
- ・南極隕石の落下年代によるペアリングの研究



Sr 同位体比分布図作成のための河川堆積物採取



石筍を用いた古気候復元のための滴下水の分析

### 文化財資料の高精度 $^{14}\text{C}$ 年代測定のための化学処理法の開発

考古遺跡から出土する炭化物、骨化石は  $^{14}\text{C}$  年代測定の有効な試料であり、考古学ならびに古環境の分野で広く利用されています。正確な  $^{14}\text{C}$  年代を得るには、土壤埋没中に資料を取り込まれた外来炭素成分（特に腐植酸）を適切な化学処理で除去が必要があります。効果的かつ効率的に腐植酸を除去する化学処理法や試料加熱法など、文化財資料の高精度年代測定のための化学処理法の開発研究を行っています。



化学処理法の検討に用いた炭化木試料



骨のバイオアバタイトを用いた  $^{14}\text{C}$  年代測定。  
写真は、貞慶と推定される火葬骨（左が低温の熱、右が高温の熱を被った骨片）



### 名古屋大学が世界に先駆けて開発・実用化した CHIME 年代測定法

名古屋大学が 1990 年代に開発した CHIME (Chemical U-Th-Total Pb Isochron Method) 年代測定法は、ウラン・トリウムが放射壊変により鉛になる現象を用いています。CHIME 年代測定法は、同位体年代測定ではなく化学年代測定であり、電子プローブマイクロアナライザー (EPMA) を用いることにより、ミクロスケールのサブグレイン年代測定を非破壊で行うことが可能です。本研究室では、モナサイト・ジルコン・ゼノタイムなど様々な鉱物のサブグレイン年代測定を行っています。

これらの鉱物は熱に対して強く、いったん形成されるとその後に高温変成作用などを被っても年代情報を保持し続け、また 2 次成長により年代累帯構造を形成することができます。ミクロンスケールの年代累帯構造を CHIME 法により正確に測定することにより、鉱物の成長記録を知り、地球の歴史を理解することができます。

### EPMA による CHIME 年代測定


CHIME 年代測定には EPMA を用います。U や Pb など通常の鉱物には数 10 ~ 数 ppm 以下しか含まれないような微量元素を効率よく定量するための分光系の設定や電子線を安定して長時間照射するための改良などがなされています。また、バックグラウンド測定やピーク分離など、微量元素の検出感度を上げて、より正確な定量分析を行うための基礎的研究を続け、装置を実用化しました。微量元素測定技術は年代測定以外にも応用され、ジルコン中のチタンを用いた地質温度計などを用いた研究も行っています。



第 2 世代の CHIME 年代測定装置

### CHIME 年代測定法の高精度化と測定可能年代の拡張

EPMA 分析における化学組成の正確さは、エックス線の測定、補正計算および標準物質の化学組成の正確さで決まります。CHIME 年代測定法で新生代の岩石の正確な年代測定が可能な研究機関として、さらなる測定法の改良を行っています。実際に測定した岩石で最も若いものは 1700 万年前に形成されたヒマラヤの岩石です。そして、100 万年前の岩石も測定可能にすることで、より正確なエックス線強度の測定法、補正計算の改良を行っています。また、海外の研究機関と協力し、標準物質の品質維持も行っています。



モナサイト中のトリウム M 線の発生領域（シミュレーション）

写真の説明: 左より、(1) 研究室の集合写真、(2) 国内・(3) 中国天山山脈・(4) アメリカユタ州におけるフィールド調査での一コマ、(5)  $^{14}\text{C}$  試料調製を行う学生、(6) CHIME 年代測定前の顕微鏡観察、(7) XRF 分析装置

Web ページ: <https://www.nendai.nagoya-u.ac.jp/>  
連絡先: minami@isee.nagoya-u.ac.jp (南)  
kato@nendai.nagoya-u.ac.jp (加藤)





# ISEEでの研究はどんな感じ? 学生3人にインタビュー!

ISEEでの生活を知るべく、  
加藤悠斗さん(工学研究科 博士前期課程1年)  
中澤利恵さん(環境学研究科 博士前期課程1年)  
青山直樹さん(理学研究科 博士前期課程1年)  
に聞いてみました!  
(インタビュー:原田)

※学年は2022年3月当時



加藤さん 中澤さん 青山さん

## <自己紹介>

**原田:** 理学研究科の宇宙線物理学研究室所属、普段は宇宙地球環境研究所（ISEE）が入っている研究所共同館IにいるM2の原田です。研究テーマは、宇宙に存在する暗黒物質を探索するための検出器開発です。

**青山:** 同じ研究室のM1で23歳の青山です。研究テーマは原田さんと同じで、原田さんの直属の後輩です。趣味はダンスです。ストリートダンス系のサークルに所属していました。最近歌うことにハマっています。よろしくお願ひします。

**加藤:** 工学研究科の宇宙電磁観測グループに所属しているM1の加藤です。地上に検出器を設置して、宇宙空間の電子の降込状況を観測し、解析を行う研究をしています。趣味はプロ野球を見る事で、中日ファンです。

**中澤:** 環境学研究科の気象学研究室のM1、中澤です。研究内容は積乱雲です。具体的には、夏の夕立の原因になっている積乱雲の発達段階をどうやったらうまく捉えられるかというものです。趣味は最近授業で知り合った友達に誘われて、昼休みに体育館でバトミントンをやっています。



作成:ISEE学生企画チーム  
理学研究科 工学研究科 環境学研究科  
原田莉奈 加藤優斗 吉村飛鳥 中澤利恵  
Special Thanks:  
青山直樹さん 永井美帆さん

『ISEE学生企画チーム』とは?

コロナ禍のために交流が減少しました。同じISEEで研究しているにもかかわらず、会ったことのない同期も沢山いました。この状況を脱却しようと、有志の学生で2021年3月に「ISEE学生企画チーム」が発足しました!昨年度は就活などを通したイベントを実施し、多くの学生と交流しました。今年度も交流会など学生同士が親睦を深めることのできるようなイベントを企画していきます。ぜひご参加ください!

## ISEEでの日常

ISEEは世界各国出身の学生が所属しています。学生同士研究について議論したり、雑談をしたりと和気あいあいとした雰囲気です。しかし、時には研究の息抜きも必要! 所属している研究室内でイベントを開催したり、学生同士で遊びに行ったりすることもあります。そんなISEEの日常の一コマを抜粋しました。



定期的に行われるミーティングの様子。  
今までの研究内容から、現在の研究内容まで、自由に討論しています。様々な人と議論すると研究も捗ります!



きれいな夕焼け鑑賞会の様子。  
研究室によっては美しい夕焼けや発達している積乱雲を見つけると、安全に配慮しながら見に行くこともあります。

## <今的研究室・研究テーマを選んだ理由>

**原田:** 青山さん、加藤さんはずっと名大だけど、中澤さんだけ他の大学から進学してるよね?

**青山:** 明確な理由がありそう…。

**中澤:** 今の研究室を選んだのは部活の先輩が名大の気象関係の研究室に在籍していて。気象といえば名古屋大学だった、という単純な理由で入ってきました。

私は飛行機に興味があって、積乱雲の突発的な発生は、飛行機が安全に飛ぶのに支障をきたす難しい事例だ、というのは以前から知っていたのですが、実はその積乱雲が上空だけじゃなくて、地上でも災害をもたらすことをニュースで聞いたんです。最近でいうと、西日本豪雨や球磨川の氾濫とかですね。この積乱雲が発達していく段階を早期で捉えることができれば、上空の安全も守ることができるし、地上の安全も守ることができることかな、ということを考え、じゃあ、積乱雲の発達の初期段階を明確に捉える研究をしようと思って今の研究を選びました。

**加藤:** 僕が今の研究室に興味を持ったのは、大学に入るまで、どこの学部学科にしようと悩んでいたときに、工学部というのはなんとなく決めていたので、工学部のホームページを見て、この研究室面白そう、と思ったのが今の研究室だったからです。研究テーマを選んだのは、中澤さんみたいに自分からではなくて、先生がいくつか提案してくれて、その中で、先生が言った「この研究は世界初だよ」という言葉に惹かれてやってみたところ、実際大変で苦労している感じです。でもやって良かったと思っているので、これからも頑張りたいと思います。

**原田:** 研究って未だ誰もやったことがない研究をやれる環境が名大は揃っているな、と思います。ホームページを見て、今の研究室に興味を持ったとのことです、その理由は?

**加藤:** 僕は、もともと工学部の電気電子情報工学科に入っていたんですけど、その中で、宇宙の研究室は2つぐらいしかなくて。僕は子供の頃から宇宙に興味があって、それを理学ではなく工学的

に生かしたい、というのがありました。せっかく電気電子情報工学科に入ったので、研究室も自分の望むところに、というのは変わらなかったから入りました。

**原田:** じゃあ、もともと宇宙関係で工学といったらそこだった?

**加藤:** 宇宙を知るというか、僕は謎を解明したいという思いがあって、理学と工学の研究が半々ができるといいなと思って、選びました。

**原田:** 私も理学と工学両方できるのは、なんかいいなと思いました。それじゃあ最後、青山くん。

**青山:** 宇宙系の研究室を選んだのは、新しいことをするのがいちばん好きで、ある程度既存のラインがあるところをやるよりは未知のものを知りたかったからです。

よく宇宙で言われる謎い文句なんですけど、地球上にあるものより、宇宙にあるものの方がいっぱい未知のものがあるじゃないか、みたいな。存在はしているけど、まだ見えていないところで、見つかってたら新規性があるし、すごいじゃないかと。あとは、うちの研究室、学生が多いんですよ。それで、和気あいあいと研究できたらいいな。

**加藤:** 雰囲気がいいとか大事!

**原田:** 一緒に頑張れる仲間は大事!!

**青山:** 研究テーマがいっぱい分岐している中でも、暗黒物質を選んだのは、さっきと同じ理由で、僕が選んだときは暗黒物質を研究テーマに選んだ人が多かったので、和気あいあいとできるだろうと思ったからです。

**原田:** 研究者にはやっぱり新しいものを発見したいという共通の思いがありそう。ありがとうございます。

## <研究室に入ってよかったこと・成長できたこと>

**原田:** 研究室に入って、よかったことや、どういう成長をこの1年でしてきたかというのを聞きたいと思いますが、いかがですか?

**中澤:** 大学院に入って、パソコンの解析とか、プログラミングとか、そういうことを本格的にやり始めました。将来私が実験系の研究をやっていくことに

なったとしても、使える計算機の技能とかプログラミングの知識とかすごく重要になってくると思います。この1年で、自分がこの先研究していく上で、得られた実験データだけじゃなくて、シミュレーションの結果がこうでしたなど、もし解析系じゃなくて実験系に進んだとしても、すごく生きるものになるな、と思いました。

**原田:** 確かにプログラミングの知識とあって、本当に研究だけじゃなくて、一般企業でも必要なスキルですよね。だから、その基礎を学べているというものは、成長してますね。

**加藤:** 成長できたなと思うのは、過程というものを大事にできるようになったというか。  
研究って、結果もちろん大事なんですが、結果に至るためにどういう風に考えて、そのためにはどういう解析をしてという部分が大切だというのを知ることができました。それが一番考え方方が変わったような、成長できたな、という部分ですね。

**原田:** 結果に対する「なんで」という根拏づけやいうか、プロセスの大切さを学んだのですね?


**青山:** 僕もある程度ロジカルな考え方ができるようになったというのが、個人的な成長です。

結果が出て終わりではなくて、それが「なぜ」というのを考えていくようになった気がします。学部時代以上に体力がついて、何日もかけていろいろな資料を調べて、これがこうです、と他の人と議論できるところまで持っていく力がまだまだ全然なんですけど、ある程度身についたかなって。「なぜ」っていうのを調べる手法とかをここで学べたのが一番大きかったかなと思いました。調べたらいろいろ出てくるんだなって思いましたし、まわりに頼ってみたら案外協力的に教えてくれるんだなっていうのも学びましたし、自分なりに考えて、結果と理由を導き出せるようにある程度なれたのがよかったです。

**原田:** 先生方を納得させるためには、根拏が必要で、私も2年やってきて、端的に伝える力という、結論を先に言って、それがなんか伝える。人に伝える力「説明力」というところも、この2年間で学べたんじゃないかな、と思います。

# 世界の舞台で活躍するために!!

## 色々な研究者と交流できる場所



理学研究科 素粒子宇宙物理学専攻  
博士前期課程 2年


康 永玟

私は韓国からの留学生で、韓国の大  
学を卒業した後、名古屋大学の宇宙地  
球環境研究所 (ISEE) の博士前期課程

に進学しました。私の研究室である太  
陽宇宙環境物理学研究室 (SST) は主に  
太陽、宇宙天気、地磁気に関する研究  
を行っています。宇宙天気とは太陽か  
ら飛んできた電磁波や高エネルギー一粒  
子による擾乱で、人間の生活にも影響  
を与えていました。高エネルギー粒子は  
太陽フレアという太陽での爆発現象に  
よって作られると知られています。

しかし、太陽フレアの物理機構は未  
だに明確に理解されていません。私は  
博士前期課程の研  
究で太陽フレアの  
物理機構を調べる  
ために磁気流体シ  
ミュレーションを行  
い、太陽フレアの  
物理機構に関する  
研究をしていま  
した。

ISEEは太陽から  
地球までの色々な  
分野の研究者が所  
属しているので他



分野の研究者とも交流しやすい研究  
所です。私の場合は研究部内のセミナー  
で太陽だけでなく、地磁気やプラズマ  
に関する研究にも接することができ、  
幅広い知識を習得することができま  
した。また、毎年色々な学会に参加でき  
るので自分の研究について発表する機  
会も多く、英語力や発表能力も身につ  
けられました。ISEEは、色々な分野の  
人と交流しながら、自分も成長できる  
場所だと思います。



工学研究科 電気工学専攻  
博士前期課程 2年



道脇 健斗

私が所属する宇宙情報処理グループ  
は、太陽に関する事から地球周辺の宇  
宙環境に關することまで幅広いテーマが

ある研究室です。私はその中でも太陽黒  
点に関する研究を行っています。黒点に  
付随して起きる太陽表面の爆発現象は  
宇宙環境に大きな影響を与えます。その  
ため、黒点は宇宙環境や太陽活動にお  
いて重要なものとなっています。私の研  
究では、近年、注目されている機械学習  
の技術を用いて太陽黒点の出現予測に  
挑戦しました。私は学部生の時は、宇宙  
に関する事も機械学習に関する事もほと  
んど学んでいなかったため、研究生活を  
通して非常に多くの知識や経験を得るこ  
とができました。また、宇宙地球環境研  
究所 (ISEE) で

は、国内・国外問わず様々な学会や  
研究集会への参加を推奨してい  
たり、研究室内で  
も理学と工学の生  
徒が同じ居室で  
研究を行っていた


り、自分とは異なる分野の研究を目にする  
機会が多くあります。そのため、他分  
野・他学科における面白い手法や知識も  
知ることができ、たくさんの刺激を得るこ  
とができます。私の様に電気系で学ん  
できた方は宇宙分野と聞くと抵抗がある  
かもしれません、先生方や先輩たちがしつ  
かりと教えてくれるので、今は知識がなく  
ても安心して研究ができる環境になっ  
ています。宇宙に少しでも興味があったり、  
様々な方と交流を深めたいと思っていた  
ら、是非 ISEE で研究してみませんか。



※学生の学年：2022年3月現在

名古屋大学では自由闊達な学風の下、自発性を重視する教育実践によって、論理的思考力と想像力に富んだ勇気ある知識人を育てることを目標に教育を進めています。ここでは、宇宙地球環境研究所で教育を受け、研究を進めている学生及び卒業生の皆さんに自分の研究内容、夢、研究所の雰囲気、日頃の学生生活等について自由に語っていただきました。

## 貴重な研究・経験のチャンス



環境学研究科 地球環境科学専攻  
博士後期課程 1年

森野 祥平

私は水文気候学研究室に所属し、南  
極内陸域における気候変動について  
研究しています。南極内陸域は気温が

-70°Cまで低下するなど過酷な環境で  
あり、気象観測所を作つて観測するこ  
とは困難です。そこで、自動気象観測  
器を設置して気候変動の監視が行わ  
れています。しかし、厳しい自然環境  
で長期間安定して稼働できる測器の開  
発は非常に困難です。今日まで先人たち  
が試行錯誤を重ねて観測システムの  
改善が行われてきており、これらの気  
象データをつなぎ合わせて長期の気温  
変化を明らかにする研究に私は取り組  
んでいます。

私は研究室でデータ解析するだけ  
ではなく、実  
際に南極に  
行って気象  
観測や測器  
のメンテナ  
ンスも行つ  
ています。  
宇宙地球環  
境研究 所  
(ISEE) に  
は、南極の



よう普通の海外旅行では行けない場  
所を訪問するチャンスが豊富にありま  
す。また、観測や学会のための海外出  
張や海外研究者との交流など国際交流  
も盛んです。さらに、「ISEE 学生企画  
チーム」(学生による学生交流のため  
のチーム)が定期的に実施しているイ  
ベントに参加することで、ISEE の他  
の研究室の学生や留学生と交流するこ  
ともできます。ISEE では、地球規模  
で様々なイベントやチャンスがあります。  
皆さんもチャンスを逃さず、学生  
生活を楽しんでください！

## 沢山の学びがある環境





工学研究科 電気工学専攻  
博士前期課程 2年

道脇 健斗

私が所属する宇宙情報処理グループ  
は、太陽に関する事から地球周辺の宇  
宙環境に關すことまで幅広いテーマが

ある研究室です。私はその中でも太陽黒  
点に関する研究を行っています。黒点に  
付随して起きる太陽表面の爆発現象は  
宇宙環境に大きな影響を与えます。そのため、  
黒点は宇宙環境や太陽活動において  
重要なものとなっています。私の研究では、  
近年、注目されている機械学習の  
技術を用いて太陽黒点の出現予測に  
挑戦しました。私は学部生の時は、宇宙  
に関する事も機械学習に関する事もほと  
んど学んでいなかったため、研究生活を  
通して非常に多くの知識や経験を得るこ  
とができました。また、宇宙地球環境研  
究所 (ISEE) で

は、国内・国外問わず様々な学会や  
研究集会への参加を推奨してい  
たり、研究室内で  
も理学と工学の生  
徒が同じ居室で  
研究を行っていた



## Explore the Possibilities of Life in ISEE



工学研究科 電気工学専攻  
博士前期課程 2年

Jie Liu

I am an international student from  
China, graduate from Institute for  
Space-Earth Environmental Research  
(ISEE). During the two and a half  
years of studying at ISEE, I can feel

that there are many possibilities in life  
waiting for me to explore.

In terms of research, I mainly study  
the propagation characteristics of  
Pc1 waves in the longitudinal range,  
and based on this, I prepare for the  
quantitative evaluation of the loss of  
radiation belt electrons. Fortunately, in  
the laboratory, I can get in touch with  
the latest research results, and have  
academic exchanges and ideological  
collisions with everyone. During the  
whole communication process, I  
realized that there is another way to  
think about the problem. In addition  
to the laboratory, I also participated  
in many domestic and  
international academic  
conferences. During  
discussions with many  
scholars, I also understood  
many other trends in  
related research.

In the life of ISEE, I also  
have many opportunities  
to get along with my  
classmates. Whether it is to go out to  
the observatory to do experiments,  
or to participate in the laboratory  
dinner together, I can feel everyone's  
enthusiasm, no matter whether each  
of us is from the same country. Here,  
I actually felt the passion of everyone  
coming together for research, and the  
kindness of everyone reaching out to  
me when I was in trouble.


Even with all the reluctance in my  
heart, it's time to say goodbye to ISEE.  
Then I can bring these wonderful  
memories to explore the infinite  
possibilities in the next stage of my  
life.





## 就職状況


前期課程卒業生の進路



### 民間企業

- ANAエアポートサービス(株) ●
- Canon Medical Systems Corporation (CMSC) ●
- Electricity Generating Authority of Thailand ●
- KDDI(株) ● (2)
- NECソリューションイノベータ ●
- NTT西日本 ● (2)
- PDエアロスペース(株) ●
- Samoa Meteorology Services ●
- Softbank(株) ●
- Western Digital Corporation ●
- Yahoo! Japan ●
- アイシン・エイ・ダブリュ(株) ●
- アイシン精機(株) ●
- アドヴィックス ●
- エリクソン・ジャパン(株) ●
- オークマ(株) ●
- オリンパス(株) ●
- (株)GA technologies ●
- (株)NTTデータ ●
- (株)NTTデータ東海 ●
- (株)NTTドコモ ●
- (株)アイヴィス ● (2)
- (株)インターネットイニシアティブ ●
- (株)インテック ●
- (株)河北新報社 ●
- (株)関電エネルギーソリューション ●
- (株)気象工学研究所 ●
- (株)セブティーニ・オリジナル ●
- (株)デンソー ● (2)
- (株)ドコモCS東海 ●
- (株)トヨタシステムズ ●
- (株)豊田自動織機 ●
- (株)野村総合研究所 ●
- (株)日立システムズ ●
- (株)日立製作所 ● (2)
- (株)ビッグツリーテクノロジー&コンサルティング ●
- (株)マキタ ●
- (株)みずほフィナンシャルグループ ●
- (株)未来技術研究所 ●
- (株)村田製作所 ●
- (株)大和総研 ●
- (株)ユーベック ●
- キヤノン(株) ●
- キヤノン電子(株) ●
- 小林製薬(株) ●
- 新日鉄住金ソリューションズ(株) ● (2)
- スカパーJSAT(株) ● (2)
- 住友林業(株) ●
- セコム(株) ●
- ソニー(株) ●

後期課程卒業生の進路



### 民間企業

- ソニーLSIデザイン(株) ●
- 中京テレビ放送(株) ●
- 東海光学(株) ●
- 東芝デベロッPMENTエンジニアリング(株) ●
- トビラシステムズ(株) ●
- トヨタ自動車(株) ● (2)
- 名古屋テレビ放送(株) ●
- 日本ガイシ(株) ●
- パナソニック(株) ●
- 浜松ホトニクス(株) ● (2)
- フューチャー(株) ●
- プラザ工業(株) ●
- 北陸電力(株) ●
- 丸紅(株) ●
- 三菱スペース・ソフトウェア(株) ● (2)
- 三菱電機(株) ● (3)
- 三菱電機メカトロニクスソフトウエア(株) ●
- 明星電気(株) ●
- ヤマトグローバルロジスティクスジャパン(株) ●
- ヤマハ発動機(株) ●
- その他 ● (2)

### 学術・開発研究機関

- インドネシア国立航空宇宙研究所 (LAPAN) ●
- インドネシア国立ガジャ・マダ大学 ●
- 学振特別研究員 ●
- 環日本海環境協力センター ●
- 千葉大学 ●
- 東京大学 ●
- 名古屋大学 ●
- 名古屋大学宇宙地球環境研究所 ● (3)

### 公務員（含む教員）

- 愛知県職員（化学職） ●
- 気象庁 ●
- 教員 ● (2)
- 岐阜県庁 ●
- 東京税関 ●
- 日本郵政(株) ●

### 進学

- 名古屋大学  
理学研究科博士課程（後期課程） ● (5) ● (2)
- 工学研究科博士課程（後期課程） ●
- 環境学研究科博士課程（後期課程） ● (4)
- 宇宙地球環境研究所（研究生） ●

### その他

- PwCあらた有限責任監査法人 ●
- (一財)日本気象協会 ●
- (一財)リモート・センシング技術センター ●
- (公財)日本気象協会 ●
- ベトナム地球科学鉱物資源研究所 ●
- 帰国後就職活動 ●

【平成 29 年度～令和 3 年度】

● : 理学研究科  
● : 工学研究科  
● : 環境学研究科

## 就職関連情報

### キャリアサポートセンターについて

キャリアサポートセンターでは、就職活動に役立つ情報やインセンシップに関する情報を窓口や NU-NAVI（名大生に特化した就職情報サイト）にて提供し、年間を通じて本学学生の進路探索活動を支援しています。

また、就職活動に関するさまざまなイベント・セミナーを開催しています。就職活動を始める前に知っておきたい基礎知識や、ステップごとの具体的なアドバイスなど、就職活動に役立つ情報が満載です。

博士課程教育推進機構キャリア教育室とも連携し、博士課程の学生的キャリア支援を行っています。

### 就職相談員による個別就職相談

キャリアサポートセンターの就職相談員（キャリアコンサルタント）が、就職・進路に関する個別相談や情報提供を行います。相談内容は、就職活動の進め方、自己分析の方法やエントリーシートの添削、模擬面接、将来のキャリア設計の相談など、多種多様に行っています。

個別就職相談の予約は NU-NAVI で受け付けています。

### 窓口での提供コンテンツ

- ・就職関連書籍の閲覧・貸出
- ・先輩の就職活動体験記の閲覧（平成 30 年度まで）
- ・窓口での相談対応
- ・OBOG 名簿の閲覧（要学生証）
- ・職業適性診断システム「キャリア・インサイト」

開室時間：月曜日～金曜日（祝日を除く）8:30～17:15

場 所：学生支援棟 1 階

### NU-NAVI 掲載コンテンツ

- ・求人検索
- ・学内イベント・ガイダンス予約
- ・個別就職相談予約
- ・動画配信（就活情報・ガイダンス等）
- ・来校企業情報
- ・OBOG 名簿一覧
- ・就職活動体験記（令和元年度以降）

### 【問い合わせ先】

キャリアサポートセンター

TEL : 052-789-2176

E-mail : s-shien.evententry@adm.nagoya-u.ac.jp

キャリアサポートセンター HP :

<https://syusyoku.jimu.nagoya-u.ac.jp/>

NU-NAVI : <https://kyujin-navi.jimu.nagoya-u.ac.jp/kyujin-navi.php>

名古屋大学  
キャリアサポートセンター



就活のすべてがこの中に！

## 研究活動を通した成長



宮本 太志郎

2020 年 3 月 理学研究科 博士前期課程修了  
(素粒子宇宙物理学専攻宇宙地球物理系  
SSE 研究室)

所属：日本製鉄株式会社  
情報システム部 名古屋システム室  
名古屋システム企画第一課

私は幼い頃からオーロラなどの自然現象や宇宙空間にロマンを感じており、縁あって宇宙地球環境研究所に入りました。研究テーマはオーロラの形態変化と高エネルギー電子降下の緯度分布との関係についてでした。希望していたオーロラの研究が出来て、日本や海外の学会に参加させてもらい、修士論文以外にも投稿論文を書かせてもらい、とても充実した大学院生活だったと思います。

学会発表や論文執筆では研究成果をわかりやすく伝えることに時間をかけ、伝わりやすい説明の仕方や文章力が少しありついたと思います。

現在は鉄鋼メーカーで製造工程のシステム企画に携わってい

ます。私の業務は工場で働く人々の業務をヒアリングして業務課題を抽出し、その課題を解決するシステムを企画することです。システムを企画するには業務知識や IT の知識も必要ですが、自分の企画したシステムを工場で働く方や実際に設計・開発する方にわかりやすく説明し、それを文章化する能力が必要になります。研究内容が仕事に直接活かされているわけではないですが、研究で培った能力が社会人になって活かされていると実感しています。

大学院では研究を通して、様々な能力が身につきます。研究が大変なこともあると思うますが、大学院生活を謳歌してください。



# 大学院入試

## 宇宙地球環境研究所で大学院生活を送るには

宇宙地球環境研究所では、理学研究科理学専攻物理科学領域、工学研究科電気工学専攻、環境学研究科地球環境科学専攻（地球惑星科学系および大気水圏科学系）の大学院博士課程（前期課程・後期課程）教育を行なっています。大学院に入学するためには、各研究科の入学試験を受験する必要がありますが、志望する研究室により受験する研究科が異なります。本パンフレットでは、受験する研究科ごとに研究内容の紹介ページを色分けしていますので、受験する際には間違えないようにしてください。

なお、各研究科・専攻の入試選抜の方法、日程等についての詳細な入試要項については、各研究科の入試関連ウェブサイトで確認するようしてください。

### 理学研究科

#### —理学専攻物理科学領域—

##### ● 2023年度大学院生募集

最新情報は入試関連ウェブサイトで公開しますので、随時確認してください。また、メール等により各種日程等の通知を希望される方は、同じくウェブサイトを通して登録できます。

理学専攻物理科学領域の研究内容に関する説明会を以下の要領で開催します。全体説明会の終了後に実施する研究室別説明会も含め、詳細情報は入試関連ウェブサイトで確認してください。

##### ◆理学専攻物理科学領域研究室説明会

###### ・全体説明会

日時：2022年5月28日（土）13:00開始

場所：名古屋大学東山キャンパス 坂田・平田ホール（理学南館）

###### ・研究室説明会

研究室別の説明会を全体説明会終了後に行います。

詳細については入試関連ウェブサイトにて公開します。

大学院入試に関する最新の情報は以下のウェブサイトで確認してください。文部科学省の認可後に実施される入試説明会（入試日程・公募要領・試験内容等に関する説明会）の情報もこのウェブサイトでお知らせします。

##### ・物理学教室 大学院入学を目指す方へ

<https://www.phys.nagoya-u.ac.jp/entrance/index.html>



##### ■大学院入試に関するお問合せ

〒464-8602 名古屋市千種区不老町

名古屋大学大学院理学研究科 教務学生係

TEL.: 052-789-2402/5756

<https://www.sci.nagoya-u.ac.jp/admission/graduate/>



### 工学研究科

#### —電気工学専攻 宇宙電磁環境工学講座—

##### ● 2023年度博士前期課程大学院生募集

電気工学専攻では、博士前期課程および博士後期課程の大学院入試を実施します。

・工学研究科電気工学専攻、電子工学専攻、情報・通信工学専攻大学院受験生の方へ

名古屋大学大学院工学研究科 電気電子情報系事務室

TEL: 052-789-3643

[http://www.nuee.nagoya-u.ac.jp/g\\_admission/index.html](http://www.nuee.nagoya-u.ac.jp/g_admission/index.html)



##### ■大学院入試に関するお問合せ

〒464-8603 名古屋市千種区不老町

名古屋大学工学部・工学研究科

教務課入学試験係

TEL: 052-789-3978/3974

E-mail: eng-admission@adm.nagoya-u.ac.jp

<https://www.engg.nagoya-u.ac.jp/prospective/index.html>



### 環境学研究科

#### —地球環境科学専攻 地球惑星科学系 地球史学講座—

#### —地球環境科学専攻 大気水圏科学系 地球水循環科学講座—

##### ● 2023年度博士前期課程大学院生募集

地球環境科学専攻では、大学院説明会、および大学院入試（前期課程・後期課程）を実施します。

##### ※本年度の開催について必ず確認してください。

・環境学研究科地球環境科学専攻 大学院受験（入試）

<http://ees.env.nagoya-u.ac.jp/exam.html>



##### ■大学院入試に関するお問合せ

〒464-8601 名古屋市千種区不老町

名古屋大学大学院環境学研究科 大学院係

TEL: 052-789-4591/4272

FAX: 052-789-3452

E-mail: env@adm.nagoya-u.ac.jp

<http://www.env.nagoya-u.ac.jp/admission/index.html>



# 学生支援

## 授業料の納入と免除・猶予

授業料は、前期（4月～9月まで）及び後期（10月～翌年3月まで）の2期に分けて267,900円を入学時に届け出た銀行預金口座から口座引落（授業料代行納付）により前期分は5月、後期分は11月に徴収します。ただし、休学・退学等の場合は上記とは異なります。在学中に授業料の改訂が行われた場合には、改訂時から新たな授業料が適用されます。

授業料免除については、所属する研究科の情報を確認してください。入学料免除・徴収猶予については、申請資格、家計基準、学力基準に基づき選考し、予算の範囲内で入学料の免除が許可されます。徴収猶予は納入期限を延期するものであり、全額を納入する必要があります。

授業料の納入とその免除・猶予の詳細については、名古屋大学ウェブサイトで確認してください。

## 学術奨励賞・育志賞

大学院博士後期課程に在学する学生（原則として標準修業年限内に在学している学生に限る）で、人物・研究水準とともに特に優秀かつ、研究科長及び指導教員から推薦のあった者を対象に受賞者を決定し、表彰します。なお、学術奨励賞受賞者で日本学術振興会育志賞への推薦を希望し、研究科長が推薦した者は、育志賞に推薦されます。

## 受賞者数・奨励金（学業奨励金）

毎年度、受賞者数は10名以内で、受賞者には、賞状及び副賞として学業奨励金50万円が贈呈されます。

## 奨学金

### 日本学生支援機構（JASSO）の奨学金

JASSOの奨学金に申込資格のある学生は、名古屋大学を通して申し込みをすることができます。詳細については、名古屋大学ウェブサイトやJASSOのウェブサイトで確認してください。

### 民間奨学財団・地方公共団体の奨学金

民間企業が母体の財団法人などが募集する奨学金制度、または都道府県や市区町村などの地方公共団体などが募集する奨学金制度もあります。これらの奨学金には、大学を経由して応募するものと、奨学団体が直接募集するものがあります。また、奨学金の形態として、給付型と貸与型があり、応募するにあたって、部局指定・条件や資格などがあります。特に地方公共団体の奨学金は、出願資格を当該地域に在住する者の子弟とし、直接公募が多いので、詳細は該当する自治体の奨学金関係のウェブサイトを確認するか、各自治体へ問合せをしてください。

本学では、募集依頼のあった団体のみウェブサイトへ掲載します。この他にも、各学部・研究科で、所属学生を対象に直接募集する場合がありますので、所属学部・研究科の掲示にも注意してください。募集などの時期や条件は各奨学団体によって種々異なり、基本的に通年募集がありますが、ほとんどが4～5月の間に集中していますので、ウェブサイトや各部局の掲示に注意し、締切に遅れないよう応募をしてください。

## RA・フェローシップについて

宇宙地球環境研究所では、本研究所の教員を主指導教員を持つ博士後期課程の学生を対象に、リサーチアシスタント（RA）の募集を行っています。また、名古屋大学では、博士後期課程の学生を対象に「名古屋大学融合フロンティアフェローシップ事業」および「東海国立大学機構融合フロンティア次世代研究事業」として人材育成のための経済的支援を行っています。日本学術振興会特別研究員への応募への対応も行っています。

## 授業料納付・学生支援に関する本学ウェブサイトの掲載箇所一覧

### ■授業料について

<http://www.nagoya-u.ac.jp/academics/campus-life/tuition/>



### ■入学後に受けられる各種免除・奨学支援について

<https://www.nagoya-u.ac.jp/academics/scholarship/index.html>



■東海国立大学機構融合フロンティア次世代研究事業・名古屋大学融合フロンティアフェローシップ事業について  
<https://dec.nagoya-u.ac.jp/>





## 博士・修士 論文一覧

### 2021 年度 修士論文一覧

#### ■理学研究科 素粒子宇宙物理学専攻 宇宙地球物理系

AM	成層圏と中間圏のオゾンの長期・短期変動を研究するため、2011年から2021年に南極昭和基地で取得されたミリ波観測データのデータ解析
SS <sub>E</sub>	将来の探査衛星計画に適応可能な半球視野型二重殻静電エネルギー分析器の開発
SS <sub>E</sub>	トロムソナトリウムライダーを用いた北極域上部中間圏8時間および6時間大気波動の研究
SS <sub>T</sub>	太陽活動領域 11283 に関するデータ駆動型 MHD シミュレーション
SS <sub>T</sub>	太陽フレアの新たな予測パラメータの開発
SS <sub>T</sub>	惑星間 CME の磁場変形に関するシミュレーション研究
CR	超小型衛星 NU-SONGS 搭載用太陽中性子・ガンマ線検出器の積層プラスチックシンチレータ部の地上での性能評価
CR	集光器への多層膜蒸着による夜光低減手法および半導体光検出器の採用による大気チレンコフ望遠鏡の性能向上の評価
CR	次世代暗黒物質直接探索実験 DARWIN のための密閉型 0.1L キセノン検出器の開発
CR	大光量の背景光環境における宇宙ガンマ線観測用半導体光検出器の特性評価

#### ■工学研究科 電気工学専攻

電磁観測	サブオーラ帯緯度の大気光イメージとあらせ衛星を用いた夜間中規模伝搬性電離圏擾乱の複数例解析
電磁観測	ミリ波大気観測装置の長期安定運用を実現する強度較正源の機械式冷却化
電磁観測	大型短波レーダーと人工衛星によるサブオーラ帯高速流に伴う電離圏アウトフローの研究
電磁観測	全天カメラとあらせ衛星の観測に基づくサブストームオーラの内部磁気圏起源領域のプラズマと電磁気場の特徴的研究
電磁観測	大型短波レーダーによる中規模伝搬性電離圏擾乱の統計解析
電磁観測	サブオーラ帯における 7 つの PWING 地上観測点を用いた Pcl 地磁気脈動の経度拡がりの統計解析
情報処理	多波長カーネル観測による脈動オーラの降下電子エネルギー推定
情報処理	あらせ衛星のデータを用いたニューラルネットワークによる放射線帶変動予測モデルの開発
情報処理	磁気要素追跡法を用いた太陽極域における表面速度の算出
情報処理	機械学習及び太陽表面磁場シミュレーションを用いた太陽活動度予測システムの開発

#### ■環境学研究科 地球環境科学専攻 大気水圏科学系 地球惑星科学系

水圏系	台風に伴う Atmospheric River の構造と時間発展に関する研究
水圏系	衛星・再解析データに基づく Iris 仮説の評価
水圏系	光学的検出に基づく非水溶性エアロゾル粒子のオフラン分析法の評価
水圏系	水害時における地方公共団体の避難情報発令に関する研究
水圏系	線状降水帯のレーダーデータを用いた客観的抽出と統計的特徴
水圏系	冬季北陸地方で発生したガンマ線グローをもたらす対流雲内部の偏波パラメータの時間変化
水圏系	地上観測に基づく X バンド偏波レーダの降水粒子判別法の改良
地惑系	滋賀県敏満寺遺跡石仏墓跡出土火葬骨のマルチ Sr 同位体比及び微量元素濃度から探る中世の文化)

### 博士論文一覧

#### ■理学研究科 素粒子宇宙物理学専攻 宇宙地球物理系

##### 2021 年度

SS <sub>T</sub>	太陽フレア発生頻度分布の統計解析によるコロナ加熱機構に関する研究シミュレーション研究
CR	ドームふじアイスコアの <sup>10</sup> Be 及び <sup>36</sup> Cl の測定による 5480BCE 宇宙線イベントの原因調査
CR	Effects of diffractive dissociation on ultra-high energy cosmic rays and measurements of diffractive dissociation using ATLAS and LHCf detectors

##### 2020 年度

SS <sub>T</sub>	磁気リコネクションの高速化機構に関する電磁流体力学シミュレーション研究
-----------------	-------------------------------------

##### 2019 年度

AM	対流圏 CO <sub>2</sub> 高度分布の観測用の気球搭載計測器の開発
SW	異なる境界ピッチ角の扱いに対する惑星間空間フラックスロープモデルフィッティングの比較研究

##### 2018 年度

AM	太陽光の吸収分光法を用いたコンパクトな地上観測システムの評価と大気中の CO <sub>2</sub> および CH <sub>4</sub> 濃度動態の解析
SS <sub>T</sub>	磁気リコネクションの高速化機構に関する電磁流体力学シミュレーション研究
SS <sub>T</sub>	非線形フォースフリー磁場外挿法と電磁流体力学シミュレーションに基づいた、太陽フレアを引き起こす活動領域磁場の研究
SS <sub>T</sub>	内部磁気圏モデル結合シミュレーションに基づく Pc5 帶 ULF 波動との相互作用による放射線帶電子の動径輸送に関する研究
SS <sub>T</sub>	磁気嵐中リングカレントにおける高エネルギー酸素イオンの増加現象に関する研究

##### 2017 年度

SS <sub>T</sub>	探査機による観測に基づく火星プラズマ境界層の研究
CR	LHC13TeV 陽子 - 陽子衝突における超前方光子生成の測定

CR

ATLAS-LHCf 検出器による  $\sqrt{s} = 13 \text{ TeV}$  陽子 - 陽子衝突での超前方中性粒子生成への回折事象の寄与の研究

#### ■工学研究科 電気工学専攻

##### 2019 年度

電磁観測	衛星と地上観測を基にした磁気圏と電離圏におけるサブストーム開始プロセスに関する研究
------	---

##### 2018 年度

電磁観測	イオノゾンデ、GPS 及び赤道大気レーダーを用いた東南アジアにおける赤道プラズマバブルの統計的研究
------	---

#### ■環境学研究科 地球環境科学専攻 大気水圏科学系 地球惑星科学系

##### 2021 年度

水圏系	都市有機エアロゾルの起源およびその吸湿性との関係：分画分析に基づく知見
-----	-------------------------------------

水圏系	東シナ海における夏季の植物プランクトン群集の研究：HPLC 色素および多波長励起蛍光光度計データ解析
-----	--

##### 2020 年度

水圏系	暖候期の日本における線状降水帯の形成メカニズムに関する研究
-----	-------------------------------

水圏系	二つの海色衛星で求めた後方散乱指数による有明海のシャットネットとスケレトネットマブルームの判別
-----	---

##### 2019 年度

水圏系	凍雨の形成機構と微物理過程に関する研究
-----	---------------------

水圏系	南太平洋西部の熱帯低気圧の特性に関する研究
-----	-----------------------

水圏系	改良した MODIS 海色データによる日本の高濁度海域有明海でのクロロフィル a の大潮小潮周期変動の研究
-----	---

##### 2018 年度

水圏系	低気圧性・高気圧性中規模渦における植物プランクトン春季大増殖に関する研究
-----	--------------------------------------

水圏系	TRMM PR および TMI プロダクトの強雨バイアス検証ならびに CloudSat および再解析データを用いたその要因評価
-----	---

水圏系	紀伊半島の森林における有機エアロゾルの雲凝縮核濃度に対する寄与
-----	---------------------------------

水圏系	静止気象衛星のラピッドスキャンを用いた台風の強化プロセスに関する研究
-----	------------------------------------

##### 2017 年度

水圏系	全球データ解析による熱帯大気準二日振動の物理特性に関する研究
-----	--------------------------------

水圏系	伊勢湾における衛星
-----	-----------

## 研究室と主担当教員一覧

### ● 理学研究科

#### 大気圏環境変動研究室 (AM)

教授 水野 亮  
准教授 長濱 智生

#### 宇宙空間物理学観測研究室 (SSE)

教授 平原 聖文  
准教授 野澤 悟徳  
准教授 大塚 雄一  
講師 大山 伸一郎

教授 塩川 和夫  
准教授 西谷 望  
准教授 能勢 正仁  
准教授 Claudia Martinez-Calderon  
助教 中島 拓

#### 太陽宇宙環境物理学研究室 (SST)

教授 草野 完也  
准教授 増田 智  
助教 家田 章正

#### 太陽圏プラズマ物理学研究室 (SW)

教授 德丸 宗利  
准教授 岩井 一正  
助教 藤木 謙一

#### 宇宙線物理学研究室 (CR)

教授 伊藤 好孝  
教授 田島 宏康  
准教授 松原 豊  
准教授 風間 慎吾\*  
准教授 三宅 芙沙  
講師 奥村 曜  
助教 毛受 弘彰

\*素粒子宇宙起源研究所 所属

### ● 工学研究科

#### 宇宙電磁観測グループ

教授 坪木 和久  
准教授 西谷 望  
准教授 篠田 太郎

#### 気象学研究室

教授 高橋 暢宏  
准教授 増永 浩彦

#### 雲降水科学研究室

教授 高橋 暢宏  
准教授 增永 浩彦

#### 宇宙情報処理グループ

教授 三好 由純  
准教授 梅田 隆行

#### 大気化学研究室

教授 持田 陸宏  
助教 大畠 祥

#### 水文気候学研究室

教授 檜山 哲哉  
准教授 栗田 直幸  
講師 藤波 初木

#### 海洋学研究室

教授 石坂 丞二  
准教授 相木 秀則  
助教 三野 義尚

#### 地球年代学研究室


教授 南 雅代  
准教授 加藤 丈典

#### 環境史学研究室

教授 北川 浩之  
助教 小田 寛貴

### ● 環境学研究科

## 名古屋大学 東山キャンパスへの交通案内



### ● 鉄道

#### JR 名古屋駅・名鉄新名古屋駅・近鉄名古屋駅からの場合

地下鉄東山線藤が丘方面行きに乗車し、本山駅で地下鉄名城線右回りに乗り換え、名古屋大学駅下車。  
所要時間約 30 分（乗換含）

地下鉄東山公園駅から徒歩 15 分

#### JR 金山駅・名鉄金山駅からの場合

地下鉄名城線左回りに乗車し、名古屋大学駅下車。  
所要時間 25 分

### ● 航空機

#### 中部国際空港を利用

空港から名鉄特急に乗車し、名古屋駅または金山駅で下車、その後地下鉄に乗り換え（上記参照）又は、空港バスにて栄または名古屋駅に出て、地下鉄に乗り換え。

## 名古屋大学 東山キャンパス

